

Amflee®

Schutz am rechten Fleck!

Wirksam gegen   



- ✓ Sicher und gut verträglich
- ✓ Einfach zu öffnen und wiederverschließbar
- ✓ Lange Wirksamkeit gegen Zecken bei Katzen<sup>1</sup>



## Amflee® Schutz am rechten Fleck!

Zur Behandlung und Vorbeugung von Zecken- und Flohbefall bei Hunden und Katzen.

### Amflee®



#### Ihre Vorteile auf einem Blick:

- Lange Wirksamkeit gegen Zecken bei Katzen
- Sicher und gut verträglich
- Angenehmer Geschmack
- Einfach zu öffnen und wiederverschließbar
- Anwender- und tierfreundliche Pipette
- Pipette ohne scharfe Kanten

#### Was ist Amflee®?

Amflee® von TAD Pharma ist ein Kontakt-Antiparasitikum das gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge bei Hunden und Katzen wirkt. Amflee® ist als Spot-On Formulierung dank der Pipette einfach aufzutragen. Die Pipette ist für das direkte Auftragen optimiert – ohne scharfe Kanten. Alternativ ist Amflee auch als praktisches Spray erhältlich. Amflee® wird alle 4 Wochen direkt auf die Haut des Tieres aufgetragen und wirkt zuverlässig und sicher.

#### Für wen ist Amflee® geeignet?

Amflee® Spot-On ist bei Hundewelpen bereits ab einem Alter von 2 Monaten und/oder einem Gewicht von 2 kg anwendbar. Bei Katzen ist Amflee® ab einem Alter von 2 Monaten und/oder einem Gewicht von 1kg anwendbar. Mit Amflee® Spray können Hunde- und Kätzchen ab 2 Tagen sicher behandelt werden. Nicht angewendet werden sollte Amflee® bei erkrankten (z.B. systemische Krankheiten, Fieber, etc.) oder genesenden Tieren.

#### Wie häufig sollte Amflee® angewandt werden?

Für eine optimale Wirksamkeit gegen Floh- und/oder Zeckenbefall sollte Amflee® alle 4 Wochen angewendet werden. Als Teil eines Behandlungsplanes gegen Flohallergiedermatitis werden ebenfalls monatliche Anwendungen für das allergische Tier und andere im Haushalt lebende Tiere empfohlen.

#### Amflee® wirkt rein über Kontakt, ist sicher und gut verträglich

Amflee® enthält den bewährten Wirkstoff Fipronil. Dieser Wirkstoff wirkt selektiv im Nervensystem von Parasiten und ist für Mensch, Hund und Katze ungefährlich.

Amflee® verteilt sich nur über die Hautoberfläche und wirkt rein über Kontakt, das heißt, Flöhe, Zecken oder Haarlinge müssen nicht erst zubeißen damit Amflee® wirkt. Auch im Gegensatz zu anderen Floh- und Zeckenmitteln birgt Amflee® keine Gefahren für das Tier, wie z.B. im Zeckenhalsband hängen zu bleiben und sich zu verletzen.

Flöhe werden innerhalb von 24 Stunden abgetötet. Zecken werden in der Regel 48 Stunden nach Kontakt mit Fipronil abgetötet. Sind zum Zeitpunkt der Applikation des Tierarzneimittels bereits Zecken (Rhipicephalus sanguineus) am Tier vorhanden, sollten diese entfernt werden.


#### Amflee® Spot-On: Anwender- und tierfreundliche Pipette

Amflee® Spot-On gibt es in einer besonders anwender- und tierfreundlichen Pipette: Sie ist einfach ohne Schere zu öffnen und wiederverschließbar. Durch die glatte Oberfläche hat die Pipette keine scharfen Kanten, die die Haut des Tieres verletzen könnten. Die Pipetten gibt es in unterschiedlichen, auf das Körpergewicht des Tieres abgestimmten, Größen. Sie erlauben eine exakte und sparsame Dosierung.

Körpergewicht des Tieres	 Katze	 2 – 10 kg	 10 – 20 kg	 20 – 40 kg	 40+ kg
	Empfohlene Mindestdosis: 6,7 mg/kg				
Dosierung	0,5 ml Pipette	0,67 ml Pipette	1,34 ml Pipette	2,68 ml Pipette	4,02 ml Pipette (+ eine proportional kleinere Pipette bei Hunden mit einem Körpergewicht von über 60 kg)
					 (+  )

#### WIE WIRD AMFLEE® SPOT-ON ANGEWENDET?

- Die Pipette aufrecht halten, die Verschlusskappe drehen und abziehen.
- Die Kappe umdrehen und mit dem anderen Ende wieder auf die Pipette setzen.
- Die Kappe drücken und drehen, bis der Verschluss bricht. Dann die Kappe von der Pipette entfernen.
- Das Fell des Tieres zwischen den Schulterblättern scheiteln, so dass die Haut sichtbar wird. Setzen Sie die Pipettenspitze auf die Haut und drücken Sie die Pipette mehrmals, um den Inhalt an 1 oder 2 Stellen direkt auf der Haut zu entleeren. Beim Wegnehmen von der Haut sollte die Pipette gedrückt gehalten werden, damit die Lösung nicht wieder eingesaugt wird.



#### WIE WIRD AMFLEE® SPRAY ANGEWENDET?

Besprühen Sie den gesamten Körper des Tieres, tragen Sie die Lösung dabei in einer Entfernung von ca. 10 bis 20 cm gegen den Strich des Haars auf und stellen Sie sicher, dass das gesamte Fell des Tieres vollständig feucht ist. Stellen Sie das Fell vor allem bei langhaarigen Tieren so auf, dass die farblose Lösung bis auf die Haut vordringen kann. Für die Behandlung der Kopffregion und bei Behandlung von jungen oder nervösen Haustieren kann die Anwendung durch Aufsprühen auf eine behandschuhte Hand und Einreiben der Lösung in das Fell erfolgen. Nicht trockenreiben, sondern auf natürliche Weise trocknen lassen.



#### ZECKENSCHUTZ

Da Amflee® ein Kontaktgift ist verhindert es nicht, dass Zecken auf das Tier gelangen. Wenn das Tier vor einem Befall behandelt wurde, werden die Zecken in den ersten 24 - 48 Stunden nach dem Befall abgetötet. Die Abtötung erfolgt üblicherweise vor dem Blutsaugen. Sobald die Zecken abgetötet sind, fallen sie im Allgemeinen vom Tier ab, verbleibende Zecken können mit sanftem Zug entfernt werden.

Sobald die Temperaturen über 6°C steigen, ist die Gefahr eines Zeckenbefalls besonders groß, und die Zecken krabbeln aktiv durchs Gestrüpp. Von diesem lassen sie sich auf ihr Tier abstreifen und krabbeln durch das Haarkleid in Richtung Haut. Um einem Zeckenbefall vorzubeugen, sollte ihr Hund oder Ihre Katze nach jedem Spazier- oder Freigang sorgfältig nach Zecken abgesucht werden.

#### FLOHSCHUTZ

Ein Flohbefall hat nichts mit mangelnder Fellpflege oder Hygiene zu tun! Begegnungen mit Wildtieren oder befallenen Artgenossen reichen meist schon für einen Flohbefall aus. Erste Anzeichen für einen Flohbefall können sein, dass ihr Tier sich kratzt, es zu Hautrötung oder Haarausfall kommt.

Ein einzelnes weibliches Exemplar der flügellosen Insekten legt bis zu 50 Eier pro Tag und lebt etwa 4 Monate. Diese Eier rieseln überall dort aus dem Fell, wo sich Hund oder Katze bewegen. In nur drei bis vier Wochen haben sich aus ihnen erwachsene Flöhe entwickelt, die sich ihrerseits fortpflanzen. Mit einer „Blutmahlzeit“ kann der Parasit bis zu 2 Monate überleben und in Ihrer Wohnung finden Flöhe ideale Fortpflanzungsbedingungen vor: Polstermöbel und Teppichboden sind für eine explosionsartige Vermehrung wie geschaffen. Und dies das ganze Jahr über.

Es kann sein, dass Sie nach kürzerer Anwendung noch Flöhe entdecken, die sich wieder aus der 1. Generation entwickelt haben. Die effektive Bekämpfung eines Flohbefalls erfordert in der Regel mindestens eine 3-monatige, kontinuierliche Behandlung. Zur optimalen Bekämpfung des Flohproblems in einem Haushalt mit mehreren Tieren, sollten alle Hunde und Katzen mit Amflee® behandelt werden.

#### TIPPS FÜR EINE ERFOLGREICHE ANWENDUNG:

Baden Sie ihr Tier innerhalb von zwei Tagen nach der Anwendung mit Amflee® nicht, auch nicht mit speziellem Hundeshampoo. Halten Sie das Behandlungsintervall ein: Die Gefahr eines Parasitenbefalls droht das ganze Jahr! Zecken sind schon ab niedrigen Temperaturen aktiv und Flöhe sogar das ganze Jahr. Achten Sie bitte immer auf die richtige Pipettengröße. Im Zweifel verwenden Sie immer die nächstgrößere Pipette um eine ausreichende Dosierung sicherzustellen.

**Amflee® 50 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen. Wirkstoff: Fipronil. Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung und Vorbeugung eines Floh- (*Ctenocephalides spp.*) und Zeckenbefalls (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*) bei Katzen. Das Tierarzneimittel (TAM) hat eine persistierende insektizide Wirkung von bis zu 4 Wochen gegen Flöhe (*Ctenocephalides spp.*), eine akarizide Wirkung von bis zu 4 Wochen gegen *Ixodes ricinus* und von bis zu einer Woche gegen *Dermacentor reticulatus* und *Rhipicephalus sanguineus*. Sind bereits zum Zeitpunkt der Anwendung des TAMs Zecken (*Rhipicephalus sanguineus*) auf dem Tier vorhanden, werden möglicherweise nicht alle Zecken innerhalb der ersten 48 Stunden, sondern erst innerhalb einer Woche abgetötet. Das TAM kann als Teil eines Behandlungsplans zur Kontrolle der Flohallergiedermatitis verwendet werden. Sofern diese zuvor durch einen Tierarzt diagnostiziert wurde. Warnhinweise: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.** Februar 2015.

**Amflee® 67 mg Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde/- 134 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde/- 268 mg Lösung zum Auftropfen für große Hunde/- 402 mg Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde. Wirkstoff: Fipronil. Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung eines Floh- (*Ctenocephalides spp.*) und Zeckenbefalls (*Dermacentor reticulatus*). Zur Behandlung von Haarlingen (*Trichodectes canis*) bei Hunden. Die meisten Haarlinge werden innerhalb von 2 Tagen abgetötet. Die insektizide Wirkung gegen einen erneuten Befall mit adulten Flöhen bleibt bis zu 8 Wochen erhalten. Das Tierarzneimittel (TAM) hat eine persistierende akarizide Wirkung von bis zu 3 Wochen gegen *Ixodes ricinus* und von bis zu 4 Wochen gegen *Rhipicephalus sanguineus* und *Dermacentor reticulatus*. Sind bereits zum Zeitpunkt der Anwendung des TAMs Zecken bestimmter Arten (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) am Tier vorhanden, werden möglicherweise nicht alle Zecken innerhalb der ersten 48 Stunden abgetötet. Das TAM kann als Teil eines Behandlungsplans zur Kontrolle der Flohallergiedermatitis verwendet werden, sofern diese zuvor durch einen Tierarzt diagnostiziert wurde. Warnhinweise: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.** Februar 2015.

**Amflee® 2,5 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung für Katzen und Hunde. Wirkstoff: Fipronil. Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung eines Floh- (*Ctenocephalides spp.*) und Zeckenbefalls (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) bei Hunden und Katzen. Zur Behandlung eines Haarlingsbefalls bei Hunden (*Trichodectes canis*) und bei Katzen (*Felicola subrostratus*). Das Tierarzneimittel (TAM) kann als Teil eines Behandlungsplans zur Kontrolle der Flohallergiedermatitis verwendet werden. Die insektizide Wirksamkeit gegen Neuinfestationen mit adulten Flöhen in Abhängigkeit vom Infestationsdruck aus der Umgebung für bis zu 2 Monate bei Katzen und bis zu 3 Monate bei Hunden. Das TAM hat in Abhängigkeit vom Infestationsdruck aus der Umgebung eine persistierende Insektizidwirkung von bis zu 4 Wochen gegen Zecken. Warnhinweise: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.** Dezember 2014.

Bildquellen: iStock.com/happyborder, iStock.com/kozorog