

Gebrauchsinformation

KORODIN Herz-Kreislauf-Tropfen®

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten 2,5 g D-Campher, 97,3 g flüssiger Extrakt aus frischen Weißdornbeeren (Crataegus), (1:1,3–1,5; Ethanol 93 Vol.-%).

Sonstige Bestandteile: 0,2 g Levomenthol (Aromastoff).
(enthält 60 Vol.-% Alkohol).

Darreichungsform und Inhalt:

Lösung in Tropfflaschen mit 10 ml, 40 ml und 100 ml Inhalt

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Pflanzliches Herz- und Kreislaufmittel

Firma und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers:

Robugen GmbH · Pharmazeutische Fabrik
Alleenstraße 22-26 · 73730 Esslingen
Telefon: 07 11/1 36 30 - 0 · Telefax: 07 11/36 74 50
e-mail: info@ROBUGEN.de · www.ROBUGEN.de

Anwendungsgebiete:

Vegetativ-funktionelle Herz-Kreislauf-Beschwerden. Hypotone und orthostatische Kreislaufregulationsstörungen. Zur unterstützenden Behandlung bei nachlassender Leistungsfähigkeit des Herzens entsprechend Stadium II nach NYHA.

Hinweis:

Bei unverändertem Fortbestehen der Krankheitssymptome über 6 Wochen oder bei Ansammlungen von Wasser in den Beinen ist eine Rücksprache mit dem Arzt zu empfehlen. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, oder bei Atemnot ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt

Vorsichtsmaßnahmen: Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit

In Tierversuchen wurde keine fruchtschädigende Wirkung gefunden. Studien mit schwangeren Frauen liegen nicht vor. Bei langjähriger Anwendung hat sich kein Verdacht auf eine Fruchtschädigung ergeben. Der Übergang in die Muttermilch ist nicht untersucht. Bei langjähriger Anwendung ergab sich kein Verdacht auf eine Beeinträchtigung des Säuglings.

Wechselwirkungen:

Keine bekannt

Dosierung mit Einzel- und Tagesgaben, Art und Dauer der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, nimmt man 3 mal täglich 10 Tropfen Korodin Herz-Kreislauf-Tropfen® auf einem Stück Zucker, das man im Mund zergehen lässt oder auf einem Stückchen Brot (Diabetiker), das man langsam

zerkaut oder man tropft es unverdünnt auf die Zunge, falls der medizinische Geschmack nicht stört.

Je nach Grad der Beschwerden kann die Dosierung nach Rücksprache mit dem Arzt auf bis zu 3 mal täglich 25 Tropfen erhöht werden. Nicht in Wasser einnehmen, da der Wirkstoff Campher nicht wasserlöslich ist.

Bei Schwäche und Ohnmachtsanfällen nimmt man im Abstand von 15 Minuten 5 - 10 Tropfen Korodin Herz-Kreislauf-Tropfen®, bis wieder Besserung eintritt.

Korodin Herz-Kreislauf-Tropfen® können je nach Art der Beschwerden auch zur Dauertherapie eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt

Sollten Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Nicht über 25 °C lagern.

Nach Ablauf des Verfalldatums ist das Arzneimittel nicht mehr anzuwenden.

Datum der Fassung der Packungsbeilage:

Februar 2005

Weitere Angaben zu Korodin Herz-Kreislauf-Tropfen®:

Korodin Herz-Kreislauf-Tropfen® sind ein seit Jahrzehnten bewährtes Präparat gegen die unter „Anwendungsgebiete“ aufgeführten Herz-Kreislauf-Beschwerden. Das Präparat enthält die wirksamen Bestandteile der frischen Weißdornbeeren und natürlichen Campher. Da Campher nicht wasserlöslich ist, sollten Korodin Herz-Kreislauf-Tropfen® nicht in Wasser eingenommen werden.

Hinweis: Zum Tropfen ist die **Flasche senkrecht zu halten** und zu Beginn ist eventuell mit dem Finger leicht gegen den Flaschenboden zu klopfen.

Füllstand technisch bedingt.

Bei flüssigen pflanzlichen Auszügen können Trübungen auftreten, die aber ohne Einfluss auf die Wirksamkeit sind.

Anmerkung: Unsere beliebten, praktischen Taschenpackungen und weitere Informationen zu Korodin Herz-Kreislauf-Tropfen® erhalten Sie kostenlos in Ihrer Apotheke.