



27

Taraxacum

F Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen

Zusammensetzung:

10 g (= 10,96 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Taraxacum Dil. D3, Berberis Dil. D4, Carduus marianus Dil. D2, Millefolium Dil. D3, Sarsaparilla Dil. D4, Scilla Dil. D4, Chininum arsenicosum Dil. D6, Phosphorus Dil. D6 je 1,25 g

Dieses Präparat enthält 58,5 Vol.-% Alkohol.

Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren

Reg.-Nr.: 2512986.00.00 Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

27 Taraxacum F Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml

1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 27 Taraxacum F Komplex nicht einnehmen?
27 Taraxacum F Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken sowie bei Chininüberempfindlichkeit, Überempfindlichkeit gegen Schafgarbe oder gegen andere

Korbblütler nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 27 Taraxacum F Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 27 Taraxacum F Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 58,5 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung

werden bei der Akutdosierung bis zu 0,7 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,35 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder

Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb

bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe

bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Die Einnahme sollte ohne medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen mit einem Teelöffel Wasser einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

siehe Rückseite

Stand der Information: Dezember 2018