



265

Leptandra F Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen

Zusammensetzung: 10 g (= 11,04 ml) Mischung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile: Leptandra Dil. D3, Podophyllum Dil. D4, Arsenicum album Dil. D6, Acidum hydrochloricum Dil. D4, Thuja Dil. D3, Hydrastis Dil. D4, Phosphorus Dil. D6 je 1,4286 g

Dieses Präparat enthält 62,0 Vol.-% Alkohol.

Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2513020.00.00

Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

265 Leptandra F Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml

1 g entspricht 22 Tropfen.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne

Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 265 Leptandra F Komplex nicht

einnehmen?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 265 Leptandra F

Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 265 Leptandra F Komplex erst nach

Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 265 Leptandra F

Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen

mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach

Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit

beachten?

265 Leptandra F Komplex soll in der Schwangerschaft

und Stillzeit nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 62,0 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung

werden bei der Akutdosierung bis zu 0,74 g Alkohol und

bei der chronischen Dosierung bis zu 0,37 g Alkohol

zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei

Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern,

Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für

Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer

Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen

keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es

soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht

angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen

alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je

5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem

Teelöffel Wasser einnehmen. Die Einnahme sollte ohne

medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5

Tropfen mit einem Teelöffel Wasser einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der

Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des

Arzneimittels: siehe Rückseite

Stand der Information: Mai 2016