

*
3
2
2
3
1
0
1
0
*

283

Physostigminum
Komplex
Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung: 10 g (= 11,00 ml) Mischung enthalten:
Arzneilich wirksame Bestandteile: Physostigminum
salicylicum Dil. D6 [HAB, Vorschr. 5a, Lsg. D2 mit Ethanol
86 % (m/m)], Agaricus Dil. D4, Artemisia vulgaris Dil. D2,
Hypericum Dil. D2, Iris Dil. D2 je 2,0 g
Dieses Präparat enthält 61,2 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe
einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung
fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat
einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 2513018.00.00 Inhalt: 50 ml
Ch.-B.: 0000 Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation
283 Physostigminum Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 22 Tropfen.
Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne
Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.
Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 283 Physostigminum Komplex nicht
einnehmen? 283 Physostigminum Komplex soll wegen des
Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken und bei einer
Salicylatüberempfindlichkeit nicht angewendet werden.
283 Physostigminum Komplex ist bei bekannter

Überempfindlichkeit gegen Artemisia vulgaris (Beifuß) oder
andere Korbblütler nicht anzuwenden.
Wann dürfen Sie 283 Physostigminum Komplex erst nach
Rücksprache mit dem Arzt anwenden? Wegen des
Alkoholgehaltes soll 283 Physostigminum Komplex bei
Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen
Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem
Arzt angewendet werden.
**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und
Warnhinweise:**
Warnhinweis:
Dieses Arzneimittel enthält 61,2 Vol.-% Alkohol.
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung
werden bei der Akutdosierung bis zu 0,72 g Alkohol und
bei der chronischen Dosierung bis zu 0,36 g Alkohol
zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken,
Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder
Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die
Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder
verstärkt werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit
beachten? Da keine ausreichend dokumentierten
Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der
Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit
dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen
keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll
deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet
werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle
halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5
Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem
Teelöffel Wasser einnehmen. Die Einnahme sollte ohne
medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen
mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Bei Besserung der
Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu
reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
siehe Rückseite
Stand der Information: Mai 2016