

\*  
2  
5  
2  
3  
1  
0  
1  
0  
\*

**304**

**Bromum  
F Komplex**

Homöopathisches  
Arzneimittel

**Mischung zum Einnehmen**  
**Zusammensetzung:** 10 g (= 10,49) Mischung enthalten:  
Arzneilich wirksame Bestandteile: Bromum D4 Dil., Aloe D4 Dil., Arnica D4 Dil., Arsenum jodatum D6 Dil., Mercurius cyanatus D8 Dil., Pulsatilla D4 Dil., Aqua silicata, Silicea D8 Dil., Hydrastis D4 Dil. je 1,1111 g  
Dieses Präparat enthält 38,0 Vol.-% Alkohol.  
Packungsbeilage beachten!  
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.  
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!  
Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren.  
Reg.-Nr.: 2513014.00.00 Inhalt: 50 ml

**Ch.-B.: 0000**      **Verwendbar bis 00/0000**

**Gebrauchsinformation**  
**304 Bromum F Komplex**  
Homöopathisches Arzneimittel  
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml  
1 g entspricht 20 Tropfen.  
**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**  
NESTMANN Pharma GmbH, Weiherweg 17, D-96199 Zapfendorf/Bamberg, Tel. 09547/92210, Fax 09547/215  
**Anwendungsgebiete:**  
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.  
Hinweise: siehe Rückseite.  
**Gegenanzeigen:**  
Wann dürfen Sie 304 Bromum F Komplex nicht einnehmen?  
304 Bromum F Komplex soll bei Alkoholkranken wegen des Alkoholgehaltes, bei Bromüberempfindlichkeit und bei Überempfindlichkeit gegen Arnika und andere Korbblütler

nicht angewendet werden.  
Wann dürfen Sie 304 Bromum F Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden? 304 Bromum F Komplex soll bei Schilddrüsenerkrankungen sowie wegen des Alkoholgehaltes bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.  
**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**  
Warnhinweis:  
Dieses Arzneimittel enthält 38,0 Vol.-% Alkohol.  
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 0,48 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,24 g Alkohol zugeführt.  
Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder

verstärkt werden.  
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.  
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:  
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.  
**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**  
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite  
**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**  
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Die Einnahme sollte ohne medizinischen Rat

nicht länger als 1 Woche erfolgen.  
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.  
**Dauer der Anwendung:** Ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche einnehmen. Siehe Rückseite.  
**Nebenwirkungen:** Nach Einnahme kann Speichelfluss auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen. Siehe Rückseite.  
**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Siehe Rückseite.  
**Stand der Information:** November 2017