


Klenk 	Heinrich Klenk Qualitätssicherung	
Abteilung / Dep.	Datum/ Date : 09.05.2014	Seite 1 von 2
Qualitätssicherung		

Brombeerblätter

Tee

Zum Trinken sowie zum Spülen oder Gurgeln nach Bereitung eines Teeaufgusses.

Inhalt: 100 g

St.Zul.Nr.: 1449.99.99

Art der Anwendung: Zum Trinken sowie zum Spülen oder Gurgeln nach Bereitung eines Teeaufgusses.

Hinweis: Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

Stoff- oder Indikationsgruppe : Pflanzliches Arzneimittel bei Durchfall.
Pflanzliches Arzneimittel bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum.

Anwendungsgebiete : Unspezifische, akute Durchfallerkrankungen; leichte Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum.

Hinweis: Bei Durchfällen, die länger als 2 Tage andauern oder mit Blutbeimengungen oder Temperaturerhöhungen einhergehen, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Durchfallerkrankungen bei Säuglingen und Kleinkindern erfordern grundsätzlich die Rücksprache mit einem Arzt. Sollten die Beschwerden bei leichten Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum länger als 1 Woche andauern, wiederkehren oder unklare Beschwerden auftreten, ist ein Arzt aufzusuchen.


Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Bei Durchfallerkrankungen muss auf Ersatz von Flüssigkeit und Salzen (Elektrolyten) als wichtigste therapeutische Maßnahme geachtet werden. Aus der verbreiteten Anwendung von Brombeerblättern als Arzneimittel oder in Lebensmitteln haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken ergeben. Zur Anwendung von Brombeerblättern in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jahren liegen jedoch keine ausreichenden Untersuchungen vor. Die Anwendung von Brombeerblättern wird daher nicht empfohlen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, wird 3-mal täglich zwischen den Mahlzeiten eine Tasse Teeaufguss getrunken oder es wird mit lauwarmen Teeaufguss gespült oder gegurgelt. Der Aufguss wird wie folgt bereitet: 2 Teelöffel voll (ca. 1,5 g) Brombeerblätter werden mit siedendem Wasser (150 ml) übergossen und nach 10 bis 15 Minuten gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben.

Klenk 	Heinrich Klenk Qualitätssicherung	
Abteilung / Dep.	Datum/ Date : 09.05.2014	Seite 2 von 2
Qualitätssicherung		

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: Arzneimittel ! Für Kinder unzugänglich aufbewahren !
Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Ch.-B.: xxx b yymmdd Verwendbar bis:

Pharmazeutischer Unternehmer: Heinrich Klenk GmbH & CO KG, Aschenhof 35,
D-97525 Schwebheim