



145

Berberis

Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
 10 g (= 10,83 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Berberis D4 Dil., Colchicum D4 Dil., Colocynthis D4 Dil., Lobelia inflata D4 Dil., Lycopodium D4 Dil., Acidum oxalicum D4 Dil., Sulfur D6 Dil., Gelsemium D4 Dil., Mandragora (HAB 1934) D4 Dil. (HAB, Vorschr. 3a), Stillingia sylvatica (HAB 1934) D4 Dil. (HAB, Vorschr. 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)) je 1 g
 Dieses Präparat enthält 54,0 Vol.-% Alkohol.
 Packungsbeilage beachten!
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
 Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren
 Reg.-Nr.: 2512444.00.00 Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
145 Berberis Komplex
 Homöopathisches Arzneimittel
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
 1 g entspricht 21 Tropfen

Anwendungsgebiete:
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
 Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
 Wann dürfen Sie 145 Berberis Komplex nicht einnehmen?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 145 Berberis Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet

werden.
 Wann dürfen Sie 145 Berberis Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 145 Berberis Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
 Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
 Während der Schwangerschaft und Stillzeit ist 145 Berberis Komplex nicht anzuwenden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
 Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 54,0 Vol.-% Alkohol.
 Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,33 g Alkohol zugeführt.
 Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
 Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
 Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
 Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen:
 Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite
Stand der Information: Dezember 2018