

Gebrauchsinformation: Information for Anwender

waylivra® 285mg Injektionslösung in einer Fertigspritze Volanerosoren

▼Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Ende Abschnitt 4.
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Waylivra und wofür wird es angewendet?
2. Was sollen Sie vor der Anwendung von Waylivra beachten?
3. Wie ist Waylivra anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Waylivra aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Waylivra und wofür wird es angewendet?

Waylivra enthält den Wirkstoff Volanerosoren und wird zur unterstützenden Behandlung der Krankheit Familiäre Chylomikronämie Syndrom (FCS) eingesetzt. Die FCS ist eine seltene Erkrankung, bei der bestimmte Fette, die sogenannten Triglyceride, in abnorm hoher Konzentration im Blut vorhanden sind. Dadurch kann es zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung mit starken Schmerzen kommen. Die Ernährung mit einer fettarmen Diät hilft Waylivra die Triglycerid-Konzentration in Ihrem Blut zu vermindern.

Waylivra kann gegeben werden, nachdem Sie bereits andere Medikamente erhalten haben oder wenn Sie noch keine andere Medikamente in Blut verwendet wurden, ohne dass diese viel Wirkung zeigen.

Sie erhalten Waylivra nur, wenn die genetischen Tests bestätigt haben, dass Sie die FCS haben und Ihr Risiko für Panikreize (oder Panikattacken) ist gering. Während der Behandlung mit Waylivra müssen Sie die stark fettreduzierte Diät, die Ihr Arzt Ihnen verordnet hat, weiterhin einhalten. Dieses Arzneimittel ist zur Behandlung von Patienten ab 18 Jahren vorgesehen.

2. Was sollen Sie vor der Anwendung von Waylivra beachten?

Waylivra darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Volanerosoren oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- wenn Sie eine sogenannte Thrombozytopenie, also zu wenige Blutplättchen im Blut haben (weniger als 140 x 10⁹). Dies kann sich dadurch bemerkbar machen, dass Verletzungen bei Ihnen sehr lange nachbluten (eine Hautabschürfung beispielsweise mehr als 5–6 Minuten). Ihr Arzt wird Ihr Blut davor untersuchen, bevor die Behandlung mit Waylivra begonnen wird. Möglicherweise wissen Sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Sie diese Störung haben oder wodurch sie verursacht sein könnte.

Wenn einer dieser Punkte auf Sie zutrifft oder Sie sich darüber nicht sicher sind, fragen Sie vor der Anwendung von Waylivra bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Sprechen Sie vor der Anwendung von Waylivra mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, wenn Sie eines der folgenden Gesundheitsprobleme haben oder schon einmal hatten:

- sehr hohe Triglyceridspiegel in Ihrem Blut, die sich zurückzuführen sind, auf eine niedrige Anzahl an Blutplättchen (Thrombopenie). Dies sind Blutzellen, die die Blutstillung unterstützen, indem sie zu einem kleinen Klumpen verklumpen. Vor der Behandlung mit diesem Arzneimittel wird Ihr Arzt Ihnen Blut abnehmen und die Zahl der Blutplättchen messen. Auch während der Behandlung wird die Zahl der Blutplättchen kontrolliert.
- jegliche Leber- oder Nierenkrankheiten.

Blutuntersuchungen
Vor Ihrer Behandlung mit diesem Arzneimittel wird Ihr Arzt Ihnen Blut abnehmen und die Zahl der Blutplättchen messen. Auch während der Behandlung wird die Zahl der Blutplättchen kontrolliert.

Suchen Sie sofort Ihren Arzt auf, wenn Hinzeitschmerzen für eine Verminderung der Blutplättchen auftreten: ungewöhnliche oder anhaltende Blutungen, kleine rote Punkte auf der Haut (so genannte petechiale Blutergüsse, Blutungen, die nicht wieder aufhören, Nasenbluten oder Nackensteifigkeit oder starke Kopfschmerzen.

Ihr Arzt kann auch alle 3 Monate einen Bluttest durchführen, um Sie auf Anzeichen einer Schädigung Ihrer Leber zu untersuchen. Sie sollten unverzüglich Ihren Arzt aufsuchen, wenn Anzeichen einer Leberschädigung auftreten, wie z. B. Gelbfärbung der Haut und der Augenlider, Bauchschmerzen oder Schwellungen im Bauchraum, Übelkeit oder Erbrechen, Verwirrtheit oder ein allgemeines Gefühl von Unwohlsein.

Falls erforderlich, kann Ihr Arzt eine Änderung der Injektionsabstände oder eine Unterbrechung der Behandlung anordnen. Es kann notwendig sein, einen auf Blutkrankheiten spezialisierten Arzt aufzusuchen, um festzustellen, ob Sie die Behandlung mit Waylivra fortsetzen sollten oder nicht.

Urntests
Ihr Arzt kann alle 3 Monate einen Urintest und/oder Bluttest durchführen, um nach Anzeichen von Nierenschädigungen zu suchen. Sie sollten unverzüglich Ihren Arzt aufsuchen, wenn Anzeichen von Nierenschädigungen auftreten, wie z. B. Schwellungen der Knöchel, Beine und Füße, Ausscheiden von weniger Urin als üblich, Kurzatmigkeit, Übelkeit, Verwirrtheit oder das Gefühl großer Müdigkeit oder Benommenheit.

Dät
Sie sollten die Behandlung mit diesem Arzneimittel erst dann beginnen, wenn Sie eine Diät zur Senkung Ihrer Triglycerid-Bilspiegel erhalten, und es ist wichtig, dass Sie diese triglyceridensinke Diät auch während der Behandlung mit Waylivra fortführen.

Kinder und Jugendliche

Waylivra darf bei Patienten unter 18 Jahren nicht angewendet werden. Die Anwendung von Waylivra bei Patienten unter 18 Jahren wurde nicht in Studien untersucht.

Anwendung von Waylivra zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anzewenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Arzt informieren, wenn Sie bereits mit einem der folgenden Mittel behandelt werden:

- sonstige Arzneimittel, die die Blutgerinnung beeinflussen können, z. B. nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) wie Ibuprofen,
- Arzneimittel zur Vorbeugung von Herzinfarkten oder Schlaganfällen (z. B. Clopidogrel, Ticagrelor oder Prasugrel), Antikoagula wie z. B. Pencilin, Arzneimittel wie Rantidin (zur Verminderung der Magensäure) oder Chinin (zur Behandlung der Malaria).
- Arzneimittel, die Leberprobleme verursachen können, z. B. Paracetamol.

Anwendung von Waylivra zusammen mit Alkohol
Die Auswirkungen einer Anwendung von Waylivra zusammen mit Alkohol sind nicht bekannt. Während der Behandlung mit diesem Arzneimittel sollten Sie aufgrund von Leberproblemen Alkohol daher meiden.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Es wird empfohlen, die Anwendung von Waylivra während der Schwangerschaft zu vermeiden.

Ob Waylivra in die Muttermilch übergeht und ob diese Wirkung auf das Kind hat, ist nicht bekannt. Wir empfehlen Ihnen mit Ihrem Arzt über das Stillen zu sprechen, um herauszufinden, was das Beste für Sie und Ihr Kind ist.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Es ist bislang unklar, ob die Anwendung von Waylivra die Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt.

Natrium
Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Dosis, d. h., es ist nahezu "natriumfrei".

3. Wie ist Waylivra anzuwenden?
Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Sie dürfen das Arzneimittel nicht verwenden, wenn die Lösung trüb ist oder Partikel enthält. Die Lösung sollte klar und farblos bis leicht gelblich sein.

Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie oft Sie das Arzneimittel injizieren sollen. In Abhängigkeit von Ihren Blutwerten und Umständen können Sie den Aufbau von Nebenwirkungen kann es die Abstände der Injektionen verändern oder die Behandlung eine Zeit lang oder dauerhaft unterbrechen.

Sie bzw. Ihre Pflegeperson erhalten eine Schulung, damit Sie lernen, wie Waylivra entsprechend der Anleitung in dieser Patientinformation anzuwenden ist. Waylivra wird unter die Haut injiziert (subkutane oder s.c.-Anwendung), wie Ihr Arzt, das medizinische Fachpersonal oder Ihre Pflegekraft Ihnen gezeigt hat. Achten Sie darauf, die gesamte in der Spritze enthaltene Flüssigkeit zu injizieren. Jede Fertigspritze zum Einmalgebrauch ergibt eine Dosis von 285 mg des Arzneimittels in 1,5 ml Lösung.

Für die Anwendung dieses Arzneimittels ist es wichtig, dass Sie die Gebrauchsanweise lesen, verstehen und genau befolgen. Die Gebrauchsanweise finden Sie am Ende dieser Packungsbeilage. Durchdrücken des Spritzenkolbens 1,5 ml Lösung abzugeben.

Wenn Sie eine größere Menge von Waylivra angewendet haben, als Sie sollten
Wenn Sie zu viel Waylivra injiziert haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker oder suchen Sie sofort eine Notfallsambulanz auf, auch wenn Sie keine Beschwerden haben.

Wenn Sie die Anwendung von Waylivra vergessen haben
Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie die nächste Dosis injizieren sollen. Wenn eine Dosis verpasst wird und dies innerhalb von 48 Stunden bemerkt wird, ist die verpasste Dosis so schnell wie möglich zu verabreichen. Wenn dies nicht innerhalb von 48 Stunden bemerkt wird, ist die verpasste Dosis zu überspringen und die nächste geplante Injektion zu verabreichen. Innerhalb von 2 Tagen darf nicht mehr Dosis eingenommen werden.

Wenn Sie die Anwendung von Waylivra abbrechen
Brechen Sie die Anwendung von Waylivra nicht ab, ohne dies zuvor mit Ihrem Arzt zu besprechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Schwerwiegende Nebenwirkungen
Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt:

- Symptome, die auf eine verminderte Anzahl der Blutplättchen (Blutplättchen zählen) und/oder die Blutstillung (siehe sind) hindeuten. Suchen Sie sofort Ihren Arzt auf, wenn Anzeichen für eine Verminderung der Blutplättchen auftreten (Blutergüsse, Blutergüsse, Blutergüsse, kleine rote Punkte auf der Haut (so genannte petechiale Blutergüsse, Blutungen, die nicht wieder aufhören, Nasenbluten oder Nackensteifigkeit oder starke Kopfschmerzen).

Ander Nebenwirkungen

Sehr häufig (kann mehr als 1 von 10 betroffenen von 10 betreffen)

- Reaktionen an der Injektionsstelle (Aussschlag, Schmerzen, Rötung, Verhärtung oder Härte/Wärme, Trübung, Juckreiz, Kribbeln, Verhärtung, Quaddeln, Blasenbildung, Pustel, Blührose, Blührose, Taubheitsgefühl, Blässe, veränderte Hautfarbe oder Brennen an der Injektionsstelle),
- schwindel, Kopfschmerzen, Müdigkeit oder anhaltende Blutungen.

Wenn einer dieser Punkte auf Sie zutrifft oder Sie sich darüber nicht sicher sind, fragen Sie vor der Anwendung von Waylivra bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach.

Häufig (kann zu 1 von 10 Behandelten betreffen)

- Haut auf der weißen Blutkörperchen im Blut
- ungewöhnliche leichte oder übermäßige Bildung von Blutergüssen oder Blutergüssen ohne offensichtliche Ursache
- Hautausschlag durch Embolisation in die Haut, Blutung aus dem Zahnfleisch oder Mund, Blut im Urin oder Stuhl, Nasenbluten,
- Bluthochdruck,
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl, Schmerzen, gipfartiges Krankheitsbild oder allgemeines Krankheitsgefühl
- Husten, erschwerter Atmung, verstopfte Nase, Schwellung des Rachens, Verdauungsstörung,
- Übelkeit oder Erbrechen, Mundtrockenheit, Durchfall, Schwellung von Nacken, Gesicht oder Zahnfleisch, Magenschmerzen, Blähbauch, Verstopfung
- Schläftlosigkeit
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Ameisenlaufen auf der Haut, Schwächegefühl oder Ohnmacht, Schwindelgefühl oder Zittern
- Sehstörungen wie Lichtblitze oder kurze, vorübergehende Blindheit auf einem Auge, Embolung unter die Augenoberfläche, Verschwommensehen
- Bluthochdruck
- Hitzegefühl, verstärktes Schwitzen, nächtliches Schwitzen, Hitzegefühl,

