#### Gebrauchsinformation: Information für

Fiasp® PumpCart® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einer

#### **Insulin aspart**

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. – Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Fiasp® und wofür wird es angewendet? 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Fiasp® beachten?

3. Wie ist Fiasp® anzuwenden?

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

5. Wie ist Fiasp® aufzubewahren? 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist Fiasp® und wofür wird es angewendet?

Fiasp® ist ein schnell wirkendes, blutzuckersenkendes Insulin. Fiasp® ist eine Injektionslösung, die Insulin aspart enthält, und wird zur Behandlung von Diabetes mellitus bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab dem Alter von 1 Jahr angewendet. Diabetes ist eine Krankheit, bei der Ihr Körper nicht genug Insulin produziert, um Ihren Blutzuckerspiegel zu kontrollieren. Die Behandlung mit Fiasp® hilft, Spätfolgen Ihres Diabetes zu verhindern.

## Über PumpCart®

Die PumpCart® Patrone wird in einer Insulinpumpe angewendet, die für die Verwendung mit dieser Patrone vorgesehen ist: • Sie deckt Ihren täglichen Insulingesamtbedarf –

- sowohl Ihren Tages- (Basal-) als auch Ihren Mahlzeiten- (Bolus-) Insulinbedarf. • Ihr Arzt oder das medizinische Fachpersonal
- müssen Ihnen eine ausführliche Einweisung gegeben haben, bevor Sie eine PumpCart® Patrone in der Pumpe verwenden

#### Tages- (Basal-) Insulinbedarf:

Wenn Sie Fiasp® in einer Pumpe anwenden, wird Ihr Insulin konstant an Ihren Körper abgegeben.

- Dies deckt Ihren Insulinbedarf über den ganzen Tag. • Bevor Sie die Tages- (Basal-) Rate einstellen oder verändern, lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisung (Bedienungsanleitung) der
- Wenn Sie die Pumpe stoppen, bedenken Sie, dass die Insulinwirkung über 3 bis 5 Stunden allmählich abnehmen wird.

#### Mahlzeiten- (Bolus-) Insulinbedarf:

- Wenden Sie Ihr Mahlzeiteninsulin bis zu 2 Minuten vor Beginn der Mahlzeit an. Es besteht auch die Möglichkeit zur Anwendung bis zu 20 Minuten nach Beginn der Mahlzeit (siehe Abschnitt 3 "Wie ist Fiasp® anzuwenden")
- Das Wirkmaximum tritt 1 bis 3 Stunden nach
- Verabreichung des Mahlzeiteninsulins ein. Die Wirkung hält 3 bis 5 Stunden an.

#### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Fiasp® beachten?

## Fiasp® darf nicht angewendet werden,

 wenn Sie allergisch gegen Insulin aspart oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Fiasp®

anwenden. Achten Sie besonders auf Folgendes: Niedriger Blutzucker (Unterzuckerung Hypoglykämie) - Wenn Ihr Blutzucker zu niedrig ist, folgen Sie den Anweisungen zu niedrigem Blutzucker in Abschnitt 4 "Welche Nebenwirkungen sind möglich?". Die blutzuckersenkende Wirkung von Fiasp® beginnt

schneller als bei anderen schnell wirkenden Insulinen. Eine eventuelle Hypoglykämie kann nach einer Anwendung von Fiasp® früher auftreten. Hoher Blutzucker (Hyperglykämie) - Wenn Ihr Blutzucker zu hoch ist, folgen Sie den Anweisungen

- zu hohem Blutzucker in Abschnitt 4 "Welche Nebenwirkungen sind möglich?"
- Umstellung von einem anderen Insulinarzneimittel Ihr Arzt muss Sie möglicherweise hinsichtlich Ihrer Insulindosis beraten.
- Wenn Ihre Insulinbehandlung mit Pioglitazon (ein orales Antidiabetikum zur Behandlung von Typ 2 Diabetes) kombiniert wird - Wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren Arzt, wenn Sie Symptome einer Herzinsuffizienz wie ungewöhnliche Kurzatmigkeit oder eine schnelle Gewichtszunahme oder lokale Schwellungen durch Flüssigkeitsansammlungen (Ödeme) bekommen.
- Augenerkrankungen Rasche Verbesserungen der Blutzuckereinstellung können zu einer vorübergehenden Verschlechterung einer diabetischen Augenerkrankung, wie der diabetischen Retinopathie, führen.
- Schmerzen durch Nervenschädigungen Wenn sich Ihr Blutzuckerspiegel sehr rasch bessert, können Sie nervenbedingte Schmerzen bekommen. Diese sind in der Regel vorübergehend.
- Schwellung an den Gelenken Wenn Sie Ihr Arzneimittel zum ersten Mal anwenden, lagert Ihr Körper möglicherweise ungewöhnlich viel Wasser ein. Dies verursacht Schwellungen an den Knöcheln und anderen Gelenken. Normalerweise klingen diese bald ah.
- Sicherstellen, dass Sie den richtigen Insulintyp verwenden - überprüfen Sie immer vor jeder Injektion das Insulinetikett, um versehentliche Verwechslungen zwischen Insulinprodukten zu vermeiden.
- Die Insulinbehandlung kann dazu führen, dass der Körper Antikörper gegen Insulin produziert (eine Substanz, die gegen Insulin wirkt). Dies erfordert jedoch nur sehr selten eine Änderung Ihrer

Wenn Sie sehbehindert sind, siehe Abschnitt 3 "Wie ist Fiasp® anzuwenden?"

Einige Bedingungen und Aktivitäten können Ihren Insulinbedarf beeinflussen. Fragen Sie Ihren Arzt um

- wenn Sie an einer Funktionsstörung Ihrer Nieren, Leber, Nebennieren, Hirnanhangdrüse oder Schilddrüse leiden.
- wenn Sie sich mehr körperlich bewegen als üblich oder wenn Sie Ihre übliche Ernährung ändern wollen, da dies Ihren Blutzuckerspiegel beeinflussen
- wenn Sie krank sind, wenden Sie Ihr Insulin weiter an und fragen Sie Ihren Arzt um Rat.
- wenn Sie ins Ausland reisen: Reisen über Zeitzonen hinweg können Ihren Insulinbedarf und den Zeitpunkt Ihrer Insulininjektionen beeinflussen.

Es wird dringend empfohlen, bei der Anwendung von Fiasp® die Bezeichnung des Arzneimittels und die Chargenbezeichnung jeder Packung zu dokumentieren, damit eine Aufzeichnung über die verwendeten Chargen geführt wird.

Fiasp® PumpCart® darf nur mit den folgenden Insulin-Infusionspumpensystemen angewendet werden: Accu-Chek® Insight und YpsoPump® Insulinpumpen. Es darf nicht mit anderen Pumpen angewendet werden, da diese Ihnen eine falsche Insulindosis geben könnten. was zu hohe oder zu niedrige Blutzuckerwerte verursachen kann.



Hautveränderungen an der Injektionsstelle

richtig, wenn Sie in einen Bereich mit Knoten.

irgendwelche Hautveränderungen an der

Vertiefungen oder Verdickungen injizieren (siehe

kann helfen, Veränderungen des

anzupassen

Kinder und Jugendliche

auswirken können.

angewendet)

angewendet)

wirkt)

hohen Blutdrucks)

• orale Kontrazeptiva (zur

Schilddrüsenerkrankungen)

Wachstumshormonmangel)

Behandlung von Asthma)

Arzt oder Apotheker.

Behandlung von Entzündungen)

Die Injektionsstelle ist regelmäßig zu wechseln; dies

Unterhautfettgewebes, wie z. B. Verdickungen oder

Vertiefungen der Haut oder Knoten unter der Haut,

vorzubeugen. Das Insulin wirkt möglicherweise nicht

Abschnitt 3 "Wie ist Fiasp® anzuwenden?"). Falls Sie

Injektionsstelle bemerken, berichten Sie Ihrem Arzt

aktuell in einen dieser betroffenen Bereiche inijzieren.

bevor Sie mit der Injektion in einen anderen Bereich

beginnen. Ihr Arzt weist Sie möglicherweise an, Ihren

Dosis Ihres Insulins oder Ihrer anderen Antidiabetika

Dieses Arzneimittel wird nicht zur Anwendung bei

Anwendung von Fiasp® zusammen mit anderen

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie

andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich

einzunehmen/anzuwenden. Einige Arzneimittel haben

Auswirkungen auf Ihren Blutzuckerspiegel - dies kann

bedeuten, dass Ihre Insulindosis angepasst werden

andere Arzneimittel eingenommen/angewendet

haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel

Nachstehend sind die gängigsten Arzneimittel

aufgeführt, die sich auf Ihre Insulinbehandlung

wenn Sie folgende Arzneimittel nehmen:

• anabole Steroide (wie z. B. Testosteron)

von Infektionen angewendet)

Fiebersenkung angewendet)

(zum Einnehmen (oral) und zur Injektion)

Ihr Blutzuckerspiegel kann sinken (Hypoglykämie),

andere Arzneimittel zur Behandlung von Diabetes

• Sulfonamid-Antibiotika (werden zur Behandlung

• Betarezeptorenblocker (werden zur Behandlung

von hohem Blutdruck oder Angina pectoris

• Salicylate (werden zur Schmerzlinderung und

Monoaminoxidasehemmer (MAO-Hemmer)

(werden zur Behandlung von Depressionen

• Angiotensin-Converting-Enzym (ACE)-Hemmer (zur

Behandlung bestimmter Herzkrankheiten oder

Ihr Blutzuckerspiegel kann steigen (Hyperglykämie),

• Danazol (ein Medikament, das auf den Eisprung

Schwangerschaftsverhütung (die "Pille"))

• Schilddrüsenhormone (zur Behandlung von

Wachstumshormon (zur Behandlung von

• Glucocorticoide (wie z. B. "Cortison" - zur

• Sympathomimetika (wie z. B. Epinephrin

(Adrenalin), Salbutamol oder Terbutalin - zur

• Thiazide (zur Behandlung hohen Blutdrucks oder

seltenen Störung, bei der zu viel Wachstumshormon

Blutzuckerspiegel entweder ansteigen lassen oder

Wenn einer der obigen Punkte auf Sie zutrifft (oder

wenn Sie nicht sicher sind), wenden Sie sich an Ihren

Anwendung von Fiasp® zusammen mit Alkohol

Wenn Sie Alkohol trinken, kann sich Ihr Insulinbedarf

ändern, da Ihr Blutzuckerspiegel entweder ansteigen

Wenn Sie schwanger sind oder wenn Sie vermuten,

Arzneimittels Ihren Arzt um Rat. Dieses Arzneimittel

kann während der Schwangerschaft angewendet

werden, es kann jedoch sein, dass Ihre Insulindosis

Entbindung angepasst werden muss. Die Menge des

während der ersten 3 Monate der Schwangerschaft

engmaschige Kontrolle Ihres Diabetes während der

Schwangerschaft ist erforderlich. Die Vermeidung von

insbesondere für die Gesundheit Ihres Babys wichtig.

Es gibt keine Einschränkungen für die Behandlung mit

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von

eingeschränkt sein. Damit könnten Sie sich selbst oder

Andere in Gefahr bringen. Fragen Sie Ihren Arzt, ob

Werkzeugen und Maschinen einschränken. Ist Ihr

Nachdem Sie Ihr Baby bekommen haben, wird Ihr

Insulinbedarf wahrscheinlich wieder auf die Menge

zurückgehen, die Sie vor der Schwangerschaft

Ein niedriger Blutzuckerspiegel kann Ihre

Blutzuckerspiegel zu niedrig, kann Ihre

Konzentrations- oder Reaktionsfähigkeit

• Ihr Blutzuckerspiegel oft zu niedrig ist.

Blutzuckerspiegel zu erkennen.

Sie es schwierig finden, einen zu niedrigen

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol

(23 mg) Natrium pro Dosis, d. h., es ist nahezu

3. Wie ist Fiasp® anzuwenden?

der Anwendung der Pumpe geschult ist.

Arzt, Apotheker oder dem medizinischen

Nahrungsaufnahme an.

Erwachsene

• Passen Sie Ihr Mahlzeiten- (Bolus-) Insulin

Dosis und wann Fiasp® anzuwenden ist

Wenn Sie blind oder sehbehindert sind und die

Anzeige der Pumpe nicht ablesen können, verwenden

Sie diese Pumpe nicht ohne Hilfe. Lassen Sie sich von

einer Person mit gutem Sehvermögen helfen, die in

Wenden Sie Ihr Insulin immer genau nach Absprache

mit Ihrem Arzt an und passen Sie Ihre Tages- (Basal-)

Dosis und Mahlzeiten- (Bolus-) Dosis gemäß den

Anweisungen Ihres Arztes an, Fragen Sie bei Ihrem

Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Mahlzeitbezogene Dosen von Fiasp® sollten direkt

(0-2 Minuten) vor Beginn der Mahlzeit angewendet

entsprechend Ihren Blutzuckermessungen und Ihrer

benötigt haben.

von Maschinen

Fiasp® während der Stillzeit.

Sie fahren können, wenn:

Fiasp® enthält Natrium

"natriumfrei"

schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu

oder sinken kann. Sie sollten daher Ihren

Schwangerschaft und Stillzeit

Blutzuckerspiegel öfter als gewöhnlich messen.

werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses

während der Schwangerschaft und nach der

von Ihnen benötigten Insulins sinkt in der Regel

und steigt in den restlichen 6 Monaten an. Eine

zu niedrigem Blutzucker (Hypoglykämien) ist

ausgeschüttet wird (Akromegalie). Beide können Ihren

Octreotid und Lanreotid - zur Behandlung einer

starker Flüssigkeitsansammlung (Wasser) im Körper).

wenn Sie folgende Arzneimittel nehmen

Kindern im Alter von unter 1 Jahr empfohlen.

Blutzucker engmaschiger zu überwachen und die

darüber. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie

#### 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einer Patrone Insulin aspart

Fiasp® PumpCart®



8-0912-81-001-3

werden. Es besteht auch die Möglichkeit zur Anwendung bis zu 20 Minuten nach Beginn der Mahlzeit.

Mahlzeitbezogene Dosen von Fiasp® sollten direkt (0-2 Minuten) vor Beginn der Mahlzeit angewendet werden. Es besteht auch die Möglichkeit zur Anwendung bis zu 20 Minuten nach Beginn der Mahlzeit in Situationen, in denen Ungewissheit darüber besteht, wie Ihr Kind essen wird. Fragen Sie Ihren Arzt für solche Situationen um Rat. Wenn Sie Ihre bisherige Ernährung umstellen möchten, besprechen Sie dies zunächst mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, da sich mit einer Ernährungsumstellung

Wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt, ob Ihre Behandlung angepasst werden

Anwendung bei älteren Patienten (≥ 65 Jahre alt) Dieses Arzneimittel kann bei älteren Patienten angewendet werden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Anpassungen bei Ihrer Dosis.

#### Anwendung bei Patienten mit Nieren- oder Leberfunktionsstörungen

auch Ihr Insulinbedarf ändern kann.

Wenn Sie Nieren- oder Leberfunktionsstörungen haben, kann es sein, dass Sie Ihren Blutzuckerspiegel öfter bestimmen müssen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Anpassungen bei Ihrer Dosis.

# Injektion von Fiasp®

Dieses Arzneimittel ist nur für Injektionen unter die Haut (subkutan) geeignet. Verwenden Sie nur eine Pumpe, die für die Verwendung mit dieser Patrone vorgesehen ist.

- Ihr Arzt oder das medizinische Fachpersonal müssen Ihnen eine ausführliche Einweisung gegeben haben, bevor Sie eine PumpCart® Patrone in der Pumpe verwenden.
- Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie Insulin auf eine andere Art und Weise spritzen müssen.

## Wo wird das Arzneimittel injiziert?

- Normalerweise werden Sie Ihr Insulin in Ihre Bauchdecke (Abdomen) injizieren. Allerdings können Sie, falls Ihr Arzt es empfiehlt, auch in Ihre Oberarme injizieren. Iniizieren Sie nicht in eine Vene oder einen Muskel.
- Wenn Sie das Infusionsset (Schlauch und Nadel) wechseln, stellen Sie sicher, dass Sie die Stelle, an der Sie die Nadel einführen, ändern. Dies kann das Risiko der Bildung von Veränderungen unter der Haut verringern (siehe Abschnitt 4 "Welche Nebenwirkungen sind möglich?")

#### Fiasp® darf nicht angewendet werden, • wenn die Patrone oder das Gerät, das die von

- Ihnen verwendete Patrone enthält, fallen gelassen. beschädigt oder zerdrückt wurde. Geben Sie es in Ihrer Apotheke zurück wenn die Patrone nicht korrekt aufbewahrt wurde
- (siehe Abschnitt 5 "Wie ist Fiasp® aufzubewahren?"). • wenn das Insulin nicht klar (z. B. trüb) und farblos

Eine detaillierte Bedienungsanleitung, wie Ihre PumpCart® angewendet wird, finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsinformation.

# Wie wird Fiasp® injiziert?

 Lesen Sie und befolgen Sie die Pumpen-Gebrauchsanweisung (Bedienungsanleitung), die

- mit Ihrer Insulinpumpe geliefert wird. • Stellen Sie sicher, dass Sie ein Infusionsset (Schlauch und Nadel) verwenden, das für Ihre Insulinpumpe geeignet ist.
- Überprüfen Sie die Bezeichnung und die Stärke auf dem Etikett der Patrone (PumpCart®), um sicherzustellen, dass es sich um Fiasp® handelt
- Infusionssets (Schläuche und Nadeln) und die PumpCart® Patrone dürfen nicht mit Anderen
- geteilt werden. Der Wechsel des Infusionssets (Schlauch und Nadel) muss gemäß den Anweisungen in der

# Bedienungsanleitung des Infusionssets erfolgen.

Was müssen Sie im Falle eines Versagens des Pumpensystems tun? Sie sollten immer ein alternatives Injektionssystem für Ihr Insulin bei sich haben, mit dem Sie im Falle eines Versagens des Pumpensystems unter die Haut injizieren können (zum Beispiel einen Injektionspen

#### oder Spritzen). Wenn Sie eine größere Menge von Fiasp® angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel Insulin injizieren, kann Ihr Blutzuckerspiegel zu niedrig werden (Hypoglykämie), siehe Hinweise in Abschnitt 4 unter "Niedriger

# Wenn Sie die Anwendung von Fiasp® vergessen

haben Wenn Sie vergessen, Ihr Insulin zu injizieren, kann Ihr Blutzuckerspiegel zu hoch werden (Hyperglykämie).

## Siehe Abschnitt 4 unter "Hoher Blutzucker" Drei einfache Regeln können helfen, das

- Auftreten von niedrigem oder hohem Blutzucker zu vermeiden: • Tragen Sie immer Ersatz-Patronen von Fiasp® bei sich. • Tragen Sie immer etwas bei sich, das Sie als
- Diabetiker ausweist. Tragen Sie immer zuckerhaltige Produkte bei sich. Siehe Abschnitt 4 unter "Was zu tun ist, wenn Ihr Blutzuckerspiegel zu niedrig wird"

#### Wenn Sie die Anwendung von Fiasp® abbrechen Beenden Sie Ihre Insulintherapie nicht, ohne mit Ihrem Arzt zu sprechen. Wenn Sie die Anwendung Ihres Insulins beenden, könnte dies zu einem sehr hohen Blutzuckerspiegel (schwere Hyperglykämie) und Ketoazidose (einer Übersäuerung des Blutes, die lebensbedrohlich sein kann) führen. Zu den

Symptomen und zu Anweisungen siehe Abschnitt 4

## 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

unter "Hoher Blutzucker".

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen Niedriger Blutzucker (Hypoglykämie) kommt bei

einer Insulinbehandlung sehr häufig vor (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen). Dies kann sehr schwerwiegend sein. Wenn Ihr Blutzuckerspiegel zu stark abfällt, können Sie bewusstlos werden. Schwere Hypoglykämien können Hirnschäden verursachen und können lebensbedrohlich sein. Wenn Sie Symptome eines niedrigen Blutzuckers haben, unternehmen Sie sofort etwas, um Ihren Blutzuckerspiegel zu erhöhen. Siehe Hinweise unter "Niedriger Blutzucker" weiter

Wenn bei Ihnen eine schwere allergische **Reaktion** (einschließlich eines anaphylaktischen Schocks) auf Insulin oder einen der sonstigen Bestandteile von Fiasp® auftritt (wie häufig dies auftritt, ist nicht bekannt), beenden Sie die Anwendung dieses Arzneimittels und kontaktieren Sie

sofort den ärztlichen Rettungsdienst.

Anzeichen einer schweren allergischen Reaktion können unter anderem sein:

- Lokale Reaktionen (z. B. Ausschlag, Rötung und Juckreiz) breiten sich auf andere Körperteile aus

- Sie fühlen sich plötzlich unwohl und schwitzen.
- Ihnen wird schlecht (Sie erbrechen sich).
- Sie bekommen Atembeschwerden.
- Sie bekommen Herzrasen oder Ihnen ist schwindelig.
- Allergische Reaktionen wie generalisierter Hautausschlag und Schwellung des Gesichts treten gelegentlich auf und können bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn sich die Symptome verschlimmern oder Sie

nach wenigen Wochen keine Verbesserung wahrnehmen Hautveränderungen an der Injektionsstelle: Wenn Sie Insulin in dieselbe Stelle injizieren, kann das Fettgewebe entweder schrumpfen (Lipoatrophie) oder dicker werden (Lipohypertrophie) (diese treten gelegentlich auf und können bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen). Außerdem können Knoten unter der Haut durch die Ansammlung eines Proteins namens Amyloid verursacht werden (kutane Amyloidose; es ist nicht bekannt, wie häufig dies auftritt). Das Insulin wirkt möglicherweise nicht richtig, wenn Sie in einen Bereich mit Knoten,

Weitere Nebenwirkungen können sein: Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen) Reaktionen an der Injektionsstelle: Es können lokale Reaktionen an der Injektionsstelle auftreten. Symptome können unter anderem sein: Ausschlag. Rötung, Entzündung, Blutergüsse, Reizungen, Schmerzen und Juckreiz. Diese Reaktionen verschwinden normalerweise nach einigen Tagen. Hautreaktionen: Anzeichen einer Allergie auf der Haut wie Ekzem, Ausschlag, Juckreiz, Nesselsucht oder Dermatitis.

Vertiefungen oder Verdickungen injizieren. Wechseln

Sie die Injektionsstelle bei jeder Injektion; dies kann

helfen, diesen Hautreaktionen vorzubeugen.

#### Allgemeine Auswirkungen einer Insulin-Behandlung einschließlich Fiasp®

► Niedriger Blutzucker (Hypoglykämie) (sehr häufig) Niedriger Blutzucker kann auftreten, falls Sie:

#### Alkohol trinken, zu viel Insulin injizieren, sich mehr als sonst körperlich anstrengen, zu wenig essen oder eine Mahlzeit auslassen.

#### Warnzeichen eines niedrigen Blutzuckers – diese können plötzlich auftreten:

Kopfschmerzen: undeutliche Sprache: Herzrasen: kalter Schweiß; kalte blasse Haut; Übelkeit; großer Hunger; Nervosität, Zittern oder Angstgefühle; ungewöhnliche Müdigkeit, Schwäche und Schläfrigkeit; Verwirrung; Konzentrationsschwierigkeiten; vorübergehende Sehstörungen.

#### Was zu tun ist, wenn Ihr Blutzuckerspiegel zu niedrig wird

- Wenn Sie bei Bewusstsein sind, behandeln Sie Ihren niedrigen Blutzuckerspiegel sofort mit 15-20 g schnell wirkender Kohlenhydrate: Nehmen Sie Traubenzucker oder eine andere stark zuckerhaltige Zwischenmahlzeit wie Fruchtsaft, Süßigkeiten oder Kekse zu sich (Sie sollten daher für den Notfall immer Traubenzucker oder eine stark zuckerhaltige Zwischenmahlzeit bei sich haben) und passen Sie die Insulinabgabe an oder stoppen Sie Ihre Pumpe.
- Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Blutzuckerspiegel nach 15-20 Minuten nochmals messen und sich nochmals behandeln, falls Ihr Blutzuckerspiegel immer noch weniger als 4 mmol/l beträgt.
- Warten Sie, bis die Symptome der Unterzuckerung verschwunden sind oder sich Ihr Blutzuckerspiegel normalisiert hat. Dann führen Sie Ihre Insulinbehandlung wie gewohnt fort.

#### Was andere Personen tun müssen, wenn Sie das Bewusstsein verlieren

Sagen Sie allen Menschen in Ihrem Umfeld, dass Sie Diabetes haben. Erklären Sie ihnen, was passieren könnte, wenn Ihr Blutzucker zu niedrig wird, einschließlich des Risikos, bewusstlos zu werden. Sagen Sie ihnen, dass sie im Falle einer

- Bewusstlosiakeit: • Sie in die stabile Seitenlage bringen müssen, damit
- Sie nicht ersticken sofort einen Arzt verständigen müssen • Ihnen nichts zu Essen oder Trinken geben dürfen, da Sie daran ersticken könnten.

Person übernehmen, die mit dessen Anwendung

Sie können das Bewusstsein schneller wiedererlangen,

- Wenn Ihnen Glucagon gegeben wurde, sollten Sie, sobald Sie wieder bei Bewusstsein sind. Zucker oder ein zuckerhaltiges Produkt zu sich nehmen
- Wenn Sie nicht auf eine Glucagoniniektion ansprechen, müssen Sie in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden.

Wenn eine anhaltende schwere Unterzuckerung nicht behandelt wird, kann dies zu vorübergehenden oder dauerhaften Hirnschäden oder sogar zum Tod führen.

# Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn:

- Ihr Blutzuckerspiegel so sehr gesunken ist, dass Sie das Bewusstsein verloren hatten
- Ihnen Glucagon injiziert wurde • Sie in letzter Zeit öfter einen zu niedrigen

Blutzuckerspiegel hatten. Sie müssen mit Ihrem Arzt sprechen, da möglicherweise die Dosierung oder der Zeitpunkt Ihrer Insulininiektionen, Ihre Ernährung oder Ihre

körperliche Bewegung angepasst werden müssen.

#### ► Hoher Blutzucker (Hyperglykämie) Hoher Blutzucker kann auftreten, falls Sie: mehr essen oder sich weniger körperlich betätigen als üblich, Alkohol trinken, eine Infektion oder Fieber

haben, nicht genug Insulin injiziert haben, dauerhaft zu wenig Insulin für Ihren Bedarf anwenden, die Anwendung Ihres Insulins vergessen oder Ihre Insulinbehandlung abbrechen. Warnzeichen hohen Blutzuckers - diese treten

#### normalerweise allmählich auf: Gerötete Haut; trockene Haut; Schläfrigkeit oder

Müdigkeit; Mundtrockenheit; fruchtig (nach Aceton) riechender Atem; verstärkter Harndrang; Durst; Appetitlosigkeit; Übelkeit oder Erbrechen. Diese Symptome können Anzeichen eines sehr ernsten Zustandes sein, den man Ketoazidose nennt. Ketoazidose bezeichnet die Zunahme von Säure im Blut, da der Körper Fett anstatt Zucker abbaut. Wenn er nicht behandelt wird, kann dieser Zustand zu diabetischem Koma und schließlich zum Tod führen

#### Was zu tun ist, wenn Ihr Blutzuckerspiegel zu hoch ansteigt

- Messen Sie Ihren Blutzuckerspiegel. • Geben Sie sich eine Korrekturdosis Insulin, wenn
- man Ihnen gezeigt hat, wie das geht. • Untersuchen Sie Ihren Urin auf Ketone.
- Wenn Ketone vorhanden sind, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf. Meldung von Nebenwirkungen

#### Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3,

# 5. Wie ist Fiasp® aufzubewahren?

Etikett nach "verw. bis" und dem Umkarton nach "verwendbar bis" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

#### Vom Kühlaggregat fernhalten. Die Patrone im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu

- als Ersatz • Während der Anwendung nicht im Kühlschrank
- Sie können Ihre Patrone (PumpCart®) bei
- Raumtemperatur (nicht über 30°C) bis zu
- 2 Wochen lang aufbewahren. • Danach kann sie bis zu 7 Tage nicht über 37°C in
- einer Pumpe, die für die Verwendung mit dieser Patrone vorgesehen ist, angewendet werden. Bewahren Sie die PumpCart® Patrone bis zum
- Gebrauch im Umkarton auf, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Schützen Sie die Patrone während des Gebrauchs immer vor Licht. Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das

Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt

# Informationen

#### Was Fiasp® enthält

- enthält 100 Einheiten Insulin aspart. Jede Patrone enthält 160 Einheiten Insulin aspart in 1,6 ml
- Die sonstigen Bestandteile sind: Phenol, Metacresol (Ph.Eur.), Glycerol, Zinkacetat, Argininhydrochlorid, Nicotinamid (Vitamin B<sub>3</sub>), Salzsäure (zur Einstellung des pH-Wertes), Natriumhydroxid (zur Einstellung des pH-Wertes) (siehe am Ende von Abschnitt 2 unter "Fiasp®

#### Wie Fiasp® aussieht und Inhalt der Packung Fiasp® ist eine klare, farblose und wässrige

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller Novo Nordisk A/S,

## Weitere Informationsquellen

Novo Allé

Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf den Internetseiten der Europäischen Arzneimittel-Agentur http://www.ema.europa.eu



- Der Wirkstoff ist: Insulin aspart. 1 ml Lösung
- Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat (Ph.Eur.), enthält Natrium") und Wasser für Injektionszwecke.

# Injektionslösung in einer Patrone.

Packungsgrößen von 5 oder eine Bündelpackung mit 25 (5 Packungen zu je 5) Patronen zu 1,6 ml. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

# Nach dem ersten Öffnen oder bei Verwendung

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Apotheker oder das medizinische

D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem

Vor dem ersten Gebrauch Im Kühlschrank lagern (2°C–8°C). Nicht einfrieren.

# Bedienungsanleitung für Fiasp<sup>®</sup> PumpCart<sup>®</sup> vorgefüllte Patrone.

Verwenden Sie Fiasp® PumpCart® nur mit einem Insulininfusions-Pumpensystem, das für die Verwendung mit dieser Patrone vorgesehen ist, wie Accu-Chek® Insight und YpsoPump® Insulinpumpen

- Insulinpumpen.


  Verwenden Sie die Patrone nicht mit anderen Medizinprodukten, die nicht für die PumpCart® Patrone vorgesehen sind.
- Ansonsten kann es zu falschen Insulindosierungen und damit zu hohem Blutzucker (Hyperglykämie) oder niedrigem Blutzucker (Hypoglykämie) kommen

Bitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung vor der Benutzung Ihrer PumpCart® Patrone sorgfältig durch.

#### Bitte lesen Sie ebenfalls die Gebrauchsanweisung der Pumpe (Bedienungsanleitung), die Ihrer Insulinpumpe

- **(Bedienungsanleitung),** die Ihrer Insulinpumpe beigefügt ist.
- Die PumpCart® Patrone kann direkt in der Pumpe verwendet werden.
- Die PumpCart® Patrone enthält 1,6 ml Insulin aspart Lösung, entsprechend 160 Einheiten.
- Dieses Arzneimittel darf niemals mit anderen
- Arzneimitteln gemischt werden.

  Die PumpCart® Patrone darf nicht wieder aufgefüllt
- Die PumpCart<sup>®</sup> Patrone darf nicht wieder aufgefüll werden. Wenn sie leer ist, muss sie entsorgt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie immer eine Ersatz PumpCart® Patrone bei sich haben.
- Die PumpCart® Patrone darf nicht in einem Insulinpen verwendet werden, da dies zu ungenauen Dosierungen führen kann.
- Schützen Sie die PumpCart® Patrone während der Aufbewahrung und in Gebrauch vor übermäßiger
- Bewahren Sie die PumpCart® Patrone unzugänglich für Dritte, insbesondere Kinder, auf.



# 1. Vor dem Einsetzen einer PumpCart® Patrone in Ihre Pumpe

- Bringen Sie eine PumpCart® Patrone auf Raumtemperatur.
- Nehmen Sie die PumpCart® Patrone aus dem Karton und der Blisterpackung.
- Überprüfen Sie anhand des Etiketts, dass es sich um
- eine Fiasp® PumpCart® Patrone handelt.Überprüfen Sie das Verfalldatum es befindet sich
- Überprüfen Sie das Verfalldatum es befindet sich auf dem Etikett und dem Karton.
- Überprüfen Sie immer, dass die PumpCart® Patrone so aussieht, wie sie aussehen sollte (Abbildung A). **Benutzen Sie sie nicht,** wenn sie beschädigt oder Insulin ausgelaufen ist oder wenn sich der Kolben so bewegt hat, dass das untere Ende des Kolbens oberhalb des weißen Etikettenbandes sichtbar ist. Dies kann eine Folge auslaufenden Insulins sein. In Abbildung A ist das untere Ende des Kolbens hinter dem weißen Etikettenband verborgen, so wie es sein sollte. Falls Sie vermuten, dass die PumpCart® Patrone beschädigt ist, geben Sie sie in Ihrer Apotheke zurück.
- Überprüfen Sie, dass das Insulin in der PumpCart® Patrone klar und farblos ist. Falls das Insulin trüb aussieht, verwenden Sie die PumpCart® Patrone nicht. Die Patrone kann kleine Luftblasen enthalten.

#### 2. Einsetzen einer neuen Fiasp® PumpCart® Patrone in Ihre Pumpe

- Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Pumpe, um eine neue
- PumpCart® Patrone in Ihre Pumpe einzusetzen.

  Setzen Sie eine PumpCart® Patrone in das
- Patronenfach der Pumpe ein. Der Kolben wird zuerst eingeführt.
- Verbinden Sie das Infusionsset mit der PumpCart® Patrone, indem Sie den Adapter auf Ihre Pumpe
- aufsetzen.Folgen Sie den Anweisungen in der
- Bedienungsanleitung der Pumpe, um mit der Anwendung Ihrer Pumpe fortzufahren.

# 3. Entnehmen einer leeren Fiasp® PumpCart® Patrone aus Ihrer Pumpe

- Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Pumpe, um die leere
- PumpCart® Patrone aus Ihrer Pumpe zu entnehmen.
- Entfernen Sie den Infusionsset-Adapter von der leeren PumpCart® Patrone.
- Entsorgen Sie die leere PumpCart® Patrone und das benutzte Infusionsset wie von Ihrem Arzt oder dem medizinischen Fachpersonal angewiesen.
- Folgen Sie den Schritten wie in Abschnitt 1 und 2 beschrieben, um eine neue PumpCart® Patrone vorzubereiten und diese in Ihre Pumpe einzusetzen.

Fiasp® und PumpCart® sind eingetragene Marken der Novo Nordisk A/S, Dänemark. Accu-Chek® ist eine eingetragene Marke der Roche Diabetes Care GmbH. YpsoPump® ist eine eingetragene Marke der TecPharma Licensing AG.

© 2021 Novo Nordisk A/S

