

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Synergon Glonoinum S Nr. 29

Homöopathisches Arzneimittel

Anwendungsgebiete

Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen

Synergon Glonoinum S Nr. 29 darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen einen der Wirkstoffe, Arnika oder andere Korbblütler sind.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, darf das Arzneimittel nicht in der Schwangerschaft und Stillzeit eingenommen werden.

Bei einer Schilddrüsenerkrankung nicht ohne ärztlichen Rat einnehmen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen.

Synergon Glonoinum S Nr. 29 enthält Ethanol (Alkohol)

Dieses Arzneimittel enthält 70 mg Alkohol (Ethanol) pro Dosiereinheit (5 Tropfen).

Die Menge in einer Dosis (5 Tropfen) dieses Arzneimittels entspricht weniger als 2 ml Bier oder 1 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die empfohlene Dosis für Jugendliche ab 12 Jahre und Erwachsene beträgt: 1 - 3 mal täglich 5 Tropfen vor den Mahlzeiten in Flüssigkeit einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Zusammensetzung

Die Wirkstoffe sind:

10 g (10,9 ml) Mischung flüssiger Verdünnungen enthält:

Natrium tetrachloroauratum Dil. D5	1,0 g
Barium iodatum Dil. D13	1,5 g
Ferrum phosphoricum Dil. D11	1,0 g
Conium maculatum Dil. D5	1,0 g
Atropa bella-donna Dil. D4	1,0 g
Nitroglycerinum Dil. D4	1,0 g
Rauwolfia serpentina Dil. D4	1,0 g
Aesculus hippocastanum Dil. D2	0,5 g
Anamirta cocculus Dil. D3	1,0 g
Arnica montana Dil. D3	1,0 g

1 g (= 1,09 ml) entspricht 34 Tropfen

Darreichungsform und Inhalt

50 ml Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Kattwiga Arzneimittel GmbH, Postfach 2567, D-48514 Nordhorn

Tel.-Nr.: 05921 7802 0, E-Mail: info@kattwiga.de

Stand der Information: Oktober 2022