



80

**Baptisia
Komplex**

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
 10 g (= 10,96 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ailanthus glandulosa Dil. D3, Apocynum cannabinum Dil. D4, Apis mellifica Dil. D4, Baptisia (HAB 1934) Dil. D3 (HAB, Vorschr. 3a), Belladonna Dil. D4, Causticum Hahnemanni Dil. D4, Helleborus niger Dil. D4 je 1,4286 g
 Dieses Präparat enthält 59,4 Vol.-% Alkohol.
 Packungsbeilage beachten!
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
 Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig
 Reg.-Nr.: 2513041.00.00 Inhalt: 50 ml
Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
80 Baptisia Komplex
 Homöopathisches Arzneimittel
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
 1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
 Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
 Wann dürfen Sie 80 Baptisia Komplex nicht einnehmen?
 80 Baptisia Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken sowie bei einer Bienenstichüberempfindlichkeit nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 80 Baptisia Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 80 Baptisia Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
 Warnhinweis:
 Dieses Arzneimittel enthält 59,4 Vol.-% Alkohol.
 Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,35 g Alkohol zugeführt.
 Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirn geschädigten sowie für Schwangere und

Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
 Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
 Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
 Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
 Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
 Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
 Soweit nicht anders verordnet, 1-3mal täglich je 5 Tropfen auf einem Teelöffel Wasser vor den Mahlzeiten einnehmen.
 Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen:
 Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
 siehe Rückseite

Stand der Information: April 2016