



# 101 Bryonia Komplex

Homöopathisches  
Arzneimittel

**Mischung zum Einnehmen**  
**Zusammensetzung:**  
 10 g (= 10,74 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Tartarus stibiatus D4 Dil., Aconitum D4 Dil., Bryonia D3 Dil., Ipecacuanha D4 Dil., Acidum phosphoricum D3 Dil., Cetraria islandica D4 Dil., Plantago major D2 Dil. je 1,4286 g  
 Dieses Präparat enthält 50,8 Vol.-% Alkohol.  
 Packungsbeilage beachten!  
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.  
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!  
 Apothekenpflichtig  
 Reg.-Nr.: 2512455.00.00

Inhalt: 50 ml  
**Ch.-B.: 0000**  
**Verwendbar bis 00/0000**

**Gebrauchsinformation**  
**101 Bryonia Komplex**  
 Homöopathisches Arzneimittel  
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml  
 1 g entspricht 20 Tropfen

**Anwendungsgebiete:**  
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.  
 Hinweise: siehe Rückseite.

**Gegenanzeigen:**  
 Wann dürfen Sie 101 Bryonia Komplex nicht einnehmen?  
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 101 Bryonia Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 101 Bryonia Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?  
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 101 Bryonia Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**  
 Warnhinweis:  
 Dieses Arzneimittel enthält 50,8 Vol.-% Alkohol.  
 Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,33 g Alkohol zugeführt.  
 Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken

oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.  
 Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?  
 Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.  
 Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:  
 Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**  
 Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite  
**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**  
 Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen.  
 Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.  
**Dauer der Anwendung:** siehe Rückseite  
**Nebenwirkungen:**  
 Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.  
**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**  
 siehe Rückseite  
**Stand der Information:** April 2016