



302
Kalium
jod.
Komplex
Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung: 10 g (= 10,64 ml) Mischung enthalten:
Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum nitricum D4 Dil.,
Auripigmentum D8 Dil. (HAB, Vorschr. 6), Kalium jodatum
D3 Dil., Kalium chloratum D3 Dil., Natrium sulfuricum D3
Dil., Pulsatilla D4 Dil. je 1,6666 g
Dieses Präparat enthält 49,2 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe
einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung
fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat
einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 2513016.00.00 **Inhalt: 50 ml**
Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
302 Kalium jod. Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 20 Tropfen.
Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne
Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.
Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 302 Kalium jod. Komplex nicht
einnehmen?
302 Kalium jod. Komplex soll wegen des
Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken sowie bei einer

Jodüberempfindlichkeit nicht angewendet werden.
Wann dürfen Sie 302 Kalium jod. Komplex erst nach
Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
302 Kalium jod. Komplex soll bei
Schilddrüsenerkrankungen sowie wegen des
Alkoholgehaltes bei Leberkranken, Epileptikern und
Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns
nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet
werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und
Warnhinweise:
Warnhinweis:
Dieses Arzneimittel enthält 49,2 Vol.-% Alkohol.
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung
werden bis zu 0,31 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei
Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern,
Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für
Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer
Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit
beachten? Da keine ausreichend dokumentierten
Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft
und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach
Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen
keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es
soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht
angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt.
Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen
vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit
einem Teelöffel Wasser einnehmen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit
der Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen:
Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des
Arzneimittels: siehe Rückseite
Stand der Information: Mai 2016