

\* 5 2 4 0 1 9 1 0 \*

122

**Mezereum**

Komplex

Homöopathisches  
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen

**Zusammensetzung:**

10 g (= 10,94 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Mezereum D3 Dil., Hyoscyamus D4 Dil., Gelsemium D4 Dil., Cuprum D10 Dil., Colocynthis D4 Dil., Belladonna D4 Dil., Chamomilla D2 Dil., Chininum sulfuricum D4 Dil., Spigelia D4 Dil., Hypericum D2 Dil., Camphora D3 Dil. je 0,9091 g  
Dieses Präparat enthält 58,4 Vol.-% Alkohol.

Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2512440.00.00

Ch.-B.: 0000

Inhalt: 50 ml  
**Verwendbar bis 00/0000**

**Gebrauchsinformation**

**122 Mezereum Komplex**

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml

1 g entspricht 22 Tropfen

**Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

**Gegenanzeigen:**

Wann dürfen Sie 122 Mezereum Komplex nicht einnehmen? 122 Mezereum Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken sowie bei einer Chininüberempfindlichkeit nicht angewendet werden.

122 Mezereum Komplex enthält Chamomilla recutita. 122

Mezereum Komplex sollte daher bei Überempfindlichkeit gegen Kamille oder gegen andere Korbblütler nicht angewandt werden.

Wann dürfen Sie 122 Mezereum Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden? Wegen des Alkoholgehaltes soll 122 Mezereum Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und**

**Warnhinweise:**

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 58,4 Vol.-% Alkohol. Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung

werden bis zu 0,34 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet

werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

**Dauer der Anwendung:** siehe Rückseite

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

siehe Rückseite

**Stand der Information:** April 2016