

*
4
4
7
0
1
9
1
0
*

146 Urtica Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung: 10 g (= 10,89 ml) Mischung enthalten:
Arzneilich wirksame Bestandteile: Urtica D2 Dil., Kalium jodatum
D4 Dil., Berberis D4 Dil., Ledum D4 Dil., Ranunculus bulbosus
D3 Dil., Rhus toxicodendron D4 Dil., Ruta D3 Dil., Juniperus
communis D3 Dil., Cyclamen D3 Dil., Betula alba (HAB 1934) D2
Dil. (HAB, Vorschr. 1) je 1 g
Dieses Präparat enthält 56,4 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer
therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden
Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren
Reg.-Nr.: 2512443.00.00 Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
146 Urtica Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne
Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 146 Urtica Komplex nicht einnehmen?
146 Urtica Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei
Alkoholkranken sowie bei einer Überempfindlichkeit
gegen Giftsumachgewächse nicht angewendet werden.
Wann dürfen Sie 146 Urtica Komplex erst nach

Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
146 Urtica Komplex soll bei Schilddrüsenerkrankungen
sowie wegen des Alkoholgehaltes bei Leberkranken,
Epileptikern und Personen mit organischen
Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit
dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und
Warnhinweise:**
Warnhinweis:
Dieses Arzneimittel enthält 56,4 Vol.-% Alkohol.
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung
werden bis zu 0,33 g Alkohol zugeführt.
Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei
Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken
oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und
Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann

beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit
beachten?
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur
Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit
vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache
mit dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen
keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es
soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht
angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen

vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel
Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist
die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen:
Aufgrund des Bestandteils Rhus toxicodendron können in
sehr seltenen Fällen – auch einige Tage nach der
Einnahme des Arzneimittels –
Magen-Darm-Beschwerden oder Hautreaktionen
auftreten.
Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
siehe Rückseite
Stand der Information: Dezember 2018