



143

Dulcamara

Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen

Zusammensetzung: 10 g (= 11,02 ml) Mischung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile: Dulcamara D3 Dil., Ledum D3 Dil., Actaea D3 Dil., Mezereum D3 Dil., Phytolacca D2 Dil., Sulfur D6 Dil., Colchicum D4 Dil., Sabina D4 Dil., Salix purpurea (HAB 1934) D2 Dil. (HAB, Vorschr. 3a) je 1,1111 g

Dieses Präparat enthält 61,6 Vol.-% Alkohol.

Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2512446.00.00

Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

143 Dulcamara Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml

1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher

ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 143 Dulcamara Komplex nicht

einnehmen?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 143 Dulcamara

Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet

werden.

Wann dürfen Sie 143 Dulcamara Komplex erst nach

Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 143 Dulcamara

Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und

Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns

nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet

werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit

beachten?

Während der Schwangerschaft und Stillzeit ist 143

Dulcamara Komplex nicht anzuwenden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und

Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 61,6 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der

Dosierungsanleitung werden bis zu 0,37 g Alkohol

zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei

Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern,

Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für

Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer

Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt

werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern

liegen keine ausreichend dokumentierten

Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12

Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5

Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem

Teelöffel Wasser einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit

der Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des

Arzneimittels: siehe Rückseite

Stand der Information: Mai 2016