


*
7
6
2
1
4
3
0
0
*



59

Ergotinum

Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Tabletten zum Einnehmen

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile: Ergotinum (HAB 1934) D4 Trit. (HAB, Vorschr. 7), Silicea D3 Trit., Thiosinaminum D3 Trit. (HAB, Vorschr. 6), Barium iodatum D4 Trit., Crataegus D3 Trit. je 27 mg. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.

Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2513006.00.00 Inhalt: 120 Tabletten

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

59 Ergotinum Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Tabletten, Originalpackung mit 120 Tabletten

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet 1 – 3mal täglich 1 Tablette vor oder zwischen den Mahlzeiten einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Hinweise für den Fall der Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn 59 Ergotinum Komplex in zu großen Mengen eingenommen wurde?

Bei der Einnahme größerer Mengen des

Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite.

Das Arzneimittel ist nach Anbruch des Behältnisses

6 Monate haltbar.

Stand der Information: Juli 2016