

**GEBRAUCHSINFORMATION:  
INFORMATION FÜR ANWENDER**
**Fucithalmic 10 mg/g Augentropfen**

Fusidinsäure

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

**Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Fucithalmic und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Fucithalmic beachten?
3. Wie ist Fucithalmic anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Fucithalmic aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

**1. Was ist Fucithalmic und wofür wird es angewendet?**

Fucithalmic sind visköse Augentropfen, die bei bakteriellen Infektionen der Bindehaut (Konjunktivitis) bei Fusidinsäureempfindlichen Erregern eingesetzt werden.

**2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Fucithalmic beachten?**
**Fucithalmic darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie allergisch gegen Fusidinsäure oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Fucithalmic anwenden.

- Tragen Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels keine Kontaktlinsen. Sie müssen die Kontaktlinsen vor der Anwendung dieses Arzneimittels entfernen und dürfen sie erst nach 12 Stunden wieder einsetzen.
- Verwenden Sie Fucithalmic nicht über einen längeren Zeitraum, da die Bakterien dann nicht mehr durch das Antibiotikum abgetötet werden.
- Wenden Sie Fucithalmic immer über den gesamten Zeitraum an, für den der Arzt es Ihnen verschrieben hat.

**Anwendung von Fucithalmic zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

**Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu

werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**Schwangerschaft**

Der Wirkstoff von Fucithalmic wird nur in sehr geringer Menge vom Körper aufgenommen, so dass keine Auswirkungen auf die Schwangerschaft zu erwarten sind. Fucithalmic Augentropfen dürfen während der Schwangerschaft angewendet werden.

**Stillzeit**

Der Wirkstoff von Fucithalmic wird nur in sehr geringer Menge vom Körper aufgenommen, so dass keine Auswirkungen auf das Stillen von Neugeborenen / Kleinkindern zu erwarten sind. Fucithalmic Augentropfen dürfen während der Stillzeit angewendet werden.

**Fortpflanzungsfähigkeit**

Der Wirkstoff von Fucithalmic wird nur in sehr geringer Menge vom Körper aufgenommen, so dass keine Auswirkungen auf die Möglichkeit einer Schwangerschaft zu erwarten sind.

**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Fucithalmic hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Fucithalmic kann eine verschwommene Sicht verursachen und Patienten sollten dies berücksichtigen.

**Fucithalmic enthält 0,11 mg Benzalkoniumchlorid pro Gramm Fucithalmic**

Benzalkoniumchlorid kann von weichen Kontaktlinsen aufgenommen werden und kann zur Verfärbung der Kontaktlinsen führen. Sie müssen die Kontaktlinsen vor der Anwendung dieses Arzneimittels entfernen.

Benzalkoniumchlorid kann auch Reizungen am Auge hervorrufen, insbesondere, wenn Sie trockene Augen oder Erkrankungen der Hornhaut (durchsichtige Schicht an der Vorderseite des Auges) haben. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn nach der Anwendung dieses Arzneimittels ein ungewöhnliches Gefühl, Brennen oder Schmerz im Auge auftritt.

**3. Wie ist Fucithalmic anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Art der Anwendung:

- Geben Sie Fucithalmic entsprechend der nachfolgenden Zeichnung tropfenweise in den Bindehautsack des erkrankten Auges:



- Wenden Sie 2-mal täglich (morgens und abends) einen Tropfen Fucithalmic an, falls vom Arzt nicht anders verordnet.
- Wenden Sie die Augentropfen während der Behandlungsdauer regelmäßig an und vermeiden Sie ein- oder mehrtägige Pausen.
- Normalerweise stellt sich nach 2 - 4 Tagen eine deutliche Besserung des Krankheitsbildes ein.
- Die komplette Abheilung wird nach 6 - 10 Tagen erreicht.
- Die Behandlung sollte noch mindestens 48 Stunden nach Normalisierung des Auges fortgesetzt werden.

**Anwendung bei Kindern und Jugendlichen**

Wenn das Medikament bei Kindern angewendet wird, können Sie Fucithalmic während des Schlafs oder im Liegen in die Augen tropfen, falls dies leichter ist.

**Wenn Sie eine größere Menge von Fucithalmic angewendet haben, als Sie sollten**

Negative Auswirkungen sind sehr unwahrscheinlich, wenn Sie versehentlich zu viele Tropfen in das Auge bekommen haben oder eine kleine Menge der Tropfen versehentlich verschluckt haben. Falls Sie versehentlich größere Mengen der Tropfen verschluckt haben oder Sie besorgt sind, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder die Notfallversorgung.

**Wenn Sie die Anwendung von Fucithalmic vergessen haben**

Wenn Sie vergessen haben, Ihre Medizin anzuwenden, wenden Sie Fucithalmic an, sobald Sie daran denken. Wenden Sie Ihre Medizin danach zur gewohnten Zeit an.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Häufig:** kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen

- Verschwommensehen (vorübergehend) im behandelten Auge
- Juckreiz, Unwohlgefühl, Reizung und Schmerzen (inkl. Brennen und Stechen) im behandelten Auge

**Gelegentlich:** kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen

- Allergische Reaktionen
- Anschwellung des Augenlides durch Wasseransammlung
- vermehrter Tränenfluss
- Allergische, schmerzlose Schwellung von Haut und Schleimhaut, v.a. im Gesichtsbereich (Angioödem)
- Hautausschlag

**Selten:** kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen

- Verschlechterung einer bestehenden Bindehautentzündung
- Nesselsucht

**Zusätzliche Nebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen**

Es wird angenommen, dass das Sicherheitsprofil bei Kindern und Jugendlichen mit dem von Erwachsenen vergleichbar ist.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn

Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist Fucithalmic aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Tube angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

**Aufbewahrungsbedingungen**

Tube nach jeder Anwendung verschließen  
Nicht über 25 °C lagern.

**Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch**

Nach erstmaligem Öffnen der Tube ist Fucithalmic 4 Wochen verwendbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. (zum Beispiel) nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/anzweimittelsorgung](http://www.bfarm.de/anzweimittelsorgung).

**6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**
**Was Fucithalmic enthält**

Der Wirkstoff ist:

1 g Fucithalmic Augentropfen enthält: 10,2 mg Fusidinsäure 0,5 H<sub>2</sub>O, entsprechend 10 mg Fusidinsäure H<sub>2</sub>O-frei.

Die sonstigen Bestandteile sind:

- 0,11 mg Benzalkoniumchlorid
- Natriumedetat (Ph. Eur.)
- Natriumhydroxid
- Mannitol (Ph. Eur.)
- Carbomer
- Wasser für Injektionszwecke

Dieses Arzneimittel enthält 0,01% Benzalkoniumchlorid, was 0,11 mg Benzalkoniumchlorid pro Gramm Fucithalmic Eye Drop entspricht

**Wie Fucithalmic aussieht und Inhalt der Packung**

Tube mit 3 g und 5 g Augentropfen

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Importeur**

Einfuhr, Umpackung und Vertrieb:  
kohlfarma GmbH, Im Holzau 8, 66663 Merzig

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2023.**