



**53**

# Hamamelis Komplex

Homöopathisches  
Arzneimittel

**Mischung zum Einnehmen**  
**Zusammensetzung:** 10 g (= 10,96 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Trillium pendulum (HAB 1934) D3 Dil. (HAB, Vorschr. 3a), Erigeron canadensis D2 Dil., Arnica D4 Dil., China D4 Dil., Hamamelis D2 Dil., Millefolium D2 Dil., Mitchella repens (HAB 1934) D2 Dil. (HAB, Vorschr. 3a), Sabina D4 Dil., Acidum sulfuricum D4 Dil., Ustilago maydis D4 Dil., Secale cornutum D4 Dil. je 0,9091 g  
 Dieses Präparat enthält 62,0 Vol.-% Alkohol.  
 Packungsbeilage beachten!  
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.  
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren! Apothekenpflichtig  
 Reg.-Nr.: 2512457.00.00 Nicht über 25°C aufbewahren. Inhalt: 50 ml

**Ch.-B.: 0000**                      **Verwendbar bis 00/0000**

**Gebrauchsinformation**  
**53 Hamamelis Komplex**  
 Homöopathisches Arzneimittel  
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml  
 1 g entspricht 22 Tropfen

**Anwendungsgebiete:**  
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.  
 Hinweise: siehe Rückseite.

**Gegenanzeigen:**  
 Wann dürfen Sie 53 Hamamelis Komplex nicht einnehmen?  
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 53 Hamamelis Komplex

bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.  
 Wann dürfen Sie 53 Hamamelis Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?  
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 53 Hamamelis Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**  
 Warnhinweis:  
 Dieses Arzneimittel enthält 62,0 Vol.-% Alkohol.  
 Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,37 g Alkohol zugeführt.  
 Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei

Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.  
 Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.  
 Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:  
 Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**  
 Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**  
 Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen.  
 Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

**Dauer der Anwendung:** siehe Rückseite

**Nebenwirkungen:**  
 Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**  
 siehe Rückseite

**Stand der Information:** November 2017