*
0
2
4
4
8
4
4
0
*

55

Sepia
F Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Tabletten zum Einnehmen
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ferrum metallicum Trit. D3, Magnesium carbonicum Trit. D3, Aloe Trit. D3, Graphites Trit. D3, Ferrum lacticum Trit. D2 (HAB, Vorschr. 6), Platinum chloratum Trit. D6, Sepia Trit. D4, Zincum cyanatum Trit. D4 je 16,875 mg. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.
Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 2513007.00.00 Inhalt: 120 Tabletten
Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
55 Sepia F Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Tabletten, Originalpackung mit 120 Tabletten

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 55 Sepia F Komplex nicht einnehmen?
55 Sepia F Komplex soll bei einer Überempfindlichkeit gegen Platinverbindungen nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Was müssen Sie vor der Anwendung von 55 Sepia F Komplex beachten? Besondere Vorsicht bei der Anwendung von 55 Sepia F Komplex ist erforderlich. Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von

55 Sepia F Komplex. Diese Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie 55 Sepia F Komplex daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 1 Tablette vor bzw. zwischen den Mahlzeiten einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden

ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Hinweise für den Fall der Überdosierung:
Was ist zu tun, wenn 55 Sepia F Komplex in zu großen Mengen eingenommen wurde?

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Nebenwirkungen:
Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
siehe Rückseite. Das Arzneimittel ist nach Anbruch des Behältnisses 6 Monate haltbar.
Stand der Information: Juli 2016