

*
0
9
5
4
8
4
4
0
*

104

Ipecacuanha F Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
10 g (= 10,85 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Myosotis arvensis Dil. D2, Phosphorus Dil. D6, Arsenum jodatum Dil. D6, Kalium carbonicum Dil. D4, Lycopodium Dil. D4, Pulsatilla Dil. D4, Ipecacuanha Dil. D4, Kalium bichromicum Dil. D4, Coccus cacti Dil. D3, Cuprum aceticum Dil. D4 je 1,0 g
Dieses Präparat enthält 56,6 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren
Req.-Nr.: 2512452.00.00 Inhalt: 50 ml
Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation
104 Ipecacuanha F Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 104 Ipecacuanha F Komplex nicht einnehmen?
104 Ipecacuanha F Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken sowie bei einer Chromüberempfindlichkeit

nicht angewendet werden.
Wann dürfen Sie 104 Ipecacuanha F Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden? 104 Ipecacuanha F Komplex soll bei Schilddrüsenerkrankungen sowie wegen des Alkoholgehaltes bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Warnhinweis:
Dieses Arzneimittel enthält 56,6 Vol.-% Alkohol.
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 0,66 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,33 g Alkohol zugeführt.
Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder

Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Die Einnahme sollte ohne medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen:
In Einzelfällen können Hautreaktionen auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
siehe Rückseite
Stand der Information: Dezember 2018