

* 6 6 8 7 7 7 4 0 *



23

Equisetum Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:

10 g (= 10,82 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Borax D3 Dil., Coffea D3 Dil., Kalium carbonicum D3 Dil., Ruta graveolens D4 Dil., Alumen D4 Dil., Equisetum arvense (HAB 1934) D3 Dil. (HAB, Vorschr. 2a), Solidago virgaurea D3 Dil. je 1,25 g. Sonstiger Bestandteil: Ethanol 43 % (m/m). Dieses Präparat enthält 55,0 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2512988.00.00

Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

23 Equisetum Komplex

Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 23 Equisetum Komplex nicht einnehmen?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 23 Equisetum Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 23 Equisetum Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden? Wegen des Alkoholgehaltes soll 23 Equisetum Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 55,0 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,32 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirnbeschädigten sowie für Schwangere und

Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite

Stand der Information: April 2016