

Gebrauchsinformation

Dr. Dr. Laubender`s

## **Belladonna comp.**

**Homöopathisches Arzneimittel**

### **Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

### **Gegenanzeigen:**

Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Eupatorium perfoliatum (Wasserdost) oder andere Korbblütler.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

keine bekannt

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### **Warnhinweis:**

Enthält 48 Vol.-% Alkohol

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

33 Tropfen Arzneimittel entsprechen 1 ml, 5 Tropfen entsprechen 0,15 ml.

### **Nebenwirkungen:**

keine bekannt

Hinweis: Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Nicht über 25°C lagern.

**Zusammensetzung:**

1 ml Mischung flüssiger Verdünnungen enthält:

arzneilich wirksame Bestandteile:

Belladonna Dil.	D 12	0,125 ml
Eupatorium perfoliatum Dil.	D 6	0,125 ml
Arsenicum album Dil.	D 8	0,125 ml
Kalium chloratum Dil.	D 8	0,125 ml
Natrium chloratum Dil.	D 6	0,125 ml
Hepar sulfuris Dil.	D 8	0,125 ml
Sulfur iodatum Dil.	D 8	0,125 ml
Ferrum phosphoricum Dil.	D 12	0,125 ml

**Darreichungsform und Inhalt:**

100 ml Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Kattwiga Arzneimittel GmbH, Postfach 2567, 48514 Nordhorn

**Stand der Information:** März 2018