

* 1 2 9 7 1 4 7 0 *



165

Inula

F Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
10 g (= 10,97 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Inula helenium (HAB 1934) D3 Dil. (HAB, Vorschr. 3a), Staphisagria D4 Dil., Asarum D12 Dil., Lycopodium D4 Dil., Natrium chloratum D3 Dil., Acidum phosphoricum D3 Dil., Sabadilla D4 Dil., Thuja D3 Dil., Bellis perennis D3 Dil., Sarsaparilla D3 Dil., Scrophularia nodosa D3 Dil., Arctium lappa D3 Dil. je 0,8333 g
Dieses Präparat enthält 60,0 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!
Nach § 38 Abs. 1 Satz 3 AMG von der Registrierung freigestelltes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Apothekenpflichtig

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

165 Inula F Komplex Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 22 Tropfen.

Anwendungsgebiete:

Nach § 38 Abs. 1 Satz 3 AMG von der Registrierung freigestelltes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 165 Inula F Komplex nicht einnehmen?
Wegen des Alkoholgehaltes soll 165 Inula F Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

165 Inula F Komplex enthält Inula helenium und sollte daher bei Überempfindlichkeit gegen Inula helenium oder gegen andere Korbblütler nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 165 Inula F Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 165 Inula F Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Warnhinweis:
Dieses Arzneimittel enthält 60,0 Vol.-% Alkohol.
Als maximale Tagesgabe nach der

Dosierungsanleitung werden bis zu 0,35 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden. Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es

soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite

Stand der Information: Mai 2016