



## 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### Was Neulasta enthält

- Der Wirkstoff ist Pegfilgrastim. Jede Fertigspritze enthält 6 mg Pegfilgrastim in 0,6 ml Lösung.
- Die sonstigen Bestandteile sind Natriumacetat, Sorbitol (E 420), Polysorbat 20 und Wasser für Injektionszwecke. Siehe Abschnitt 2.

### Wie Neulasta aussieht und Inhalt der Packung

Neulasta ist eine klare, farblose Injektionslösung in einer Fertigspritze (6 mg/0,6 ml). Jede Packung enthält 1 Fertigspritze aus Glas mit einer aufgesetzten Injektionsnadel aus rostfreiem Stahl und Nadelschutzkappe.

Die Fertigspritze (mit oder ohne Verblisterung) wird ferner mit einem automatischen Nadelschutz angeboten.

### Zulassungsinhaber und Hersteller

Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Niederlande

### Parallel vertrieben von:

Orifarm GmbH, Fixheider Str. 4, 51381 Leverkusen

### Umgepackt von:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tschechien

Falls Sie weitere Informationen über das Arzneimittel wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung.

### Deutschland

Amgen GmbH  
Tel.: +49 89 1490960

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2023.**

### Weitere Informationsquellen

Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf den Internetseiten der Europäischen Arzneimittel-Agentur <http://www.ema.europa.eu/> verfügbar.

Gebrauchsanleitung:	
Darstellung der Einzelteile	
Vor der Anwendung	Nach der Anwendung
<p>Kolben</p> <p>Fingerringe</p> <p>Etikett der Spritze</p> <p>Zylinder der Spritze</p> <p>Nadelschutz der Spritze</p> <p>Nadelschutzfeder</p> <p>Graue Nadelschutzkappe, aufgesetzt</p>	<p>Kolben nach der Anwendung</p> <p>Etikett der Spritze</p> <p>Zylinder der Spritze nach der Anwendung</p> <p>Nadel nach der Anwendung</p> <p>Nadelschutzfeder nach der Anwendung</p> <p>Graue Nadelschutzkappe, abgezogen</p>
Wichtig	
<p><b>Lesen Sie diese wichtigen Informationen, bevor Sie eine Neulasta-Fertigspritze mit automatischem Nadelschutz anwenden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es ist wichtig, dass Sie nicht versuchen, sich selbst die Injektion zu geben, wenn Sie nicht vorher von Ihrem Arzt oder Ihrem Krankenpflegepersonal geschult wurden.</li> <li>• Neulasta wird als Injektion in das Gewebe direkt unter der Haut angewendet (subkutane Injektion).</li> <li>• Teilen Sie Ihrem Arzt mit, falls Sie eine Latexallergie haben. Die Nadelschutzkappe auf der Fertigspritze enthält ein Latexderivat und kann schwere allergische Reaktionen verursachen.</li> </ul> <p><b>X</b> Entfernen Sie die graue Nadelschutzkappe <b>nicht</b> von der Fertigspritze, bevor Sie für die Injektion bereit sind.</p> <p><b>X</b> Wenden Sie die Fertigspritze <b>nicht</b> an, wenn sie auf eine harte Oberfläche gefallen ist. Verwenden Sie eine neue Fertigspritze und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an Ihr Krankenpflegepersonal.</p> <p><b>X</b> Versuchen Sie <b>nicht</b>, die Fertigspritze vor der Injektion zu aktivieren.</p> <p><b>X</b> Versuchen Sie <b>nicht</b>, den durchsichtigen Nadelschutz der Fertigspritze von der Fertigspritze zu entfernen.</p> <p><b>X</b> Versuchen Sie <b>nicht</b>, das abziehbare Etikett auf dem Zylinder der Fertigspritze abzulösen, bevor Sie Ihre Injektion anwenden.</p> <p>Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an Ihr Krankenpflegepersonal, falls Sie Fragen haben.</p>	
Schritt 1: Vorbereitung	
A	Entnehmen Sie der Packung den Einsatz mit der Fertigspritze und stellen Sie die Gegenstände bereit, die Sie für Ihre Injektion benötigen: Alkoholtupfer, Wattebausch oder Verbandmull, Pflaster und einen durchstichsicheren Behälter (nicht enthalten).
<p>Für eine angenehmere Injektion bewahren Sie die Fertigspritze vor der Injektion für etwa 30 Minuten bei Raumtemperatur auf. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife.</p> <p>Legen Sie die neue Fertigspritze und die anderen Gegenstände auf eine saubere, gut beleuchtete Arbeitsfläche.</p> <p><b>X</b> Versuchen Sie <b>nicht</b>, die Spritze mit einer Wärmequelle wie heißem Wasser oder einer Mikrowelle zu erwärmen.</p> <p><b>X</b> Setzen Sie die Fertigspritze <b>nicht</b> direktem Sonnenlicht aus.</p> <p><b>X</b> Schütteln Sie die Fertigspritze <b>nicht</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bewahren Sie Fertigspritzen für Kinder unzugänglich auf.</b></li> </ul>	
B	Öffnen Sie den Einsatz, indem Sie die Abdeckung abziehen. Greifen Sie den Nadelschutz der Fertigspritze, um die Fertigspritze aus dem Einsatz zu entnehmen.
<p><b>Hier greifen</b></p>	
<p>Aus Sicherheitsgründen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>X</b> <b>Nicht</b> am Kolben greifen.</li> <li><b>X</b> <b>Nicht</b> an der grauen Nadelschutzkappe greifen.</li> </ul>	

C	Kontrollieren Sie das Arzneimittel und die Fertigspritze.
<p><b>X</b> Wenden Sie die Fertigspritze <b>nicht</b> an, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• das Arzneimittel trübe ist oder Partikel darin enthalten sind. Es muss eine klare und farblose Flüssigkeit sein.</li> <li>• irgendein Teil gesprungen oder gebrochen zu sein scheint.</li> <li>• die graue Nadelschutzkappe fehlt oder nicht fest angebracht ist.</li> <li>• der letzte Tag des angegebenen Monats des Verfalldatums, welches auf dem Etikett aufgedruckt ist, überschritten ist.</li> </ul> <p>In allen diesen Fällen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an Ihr Krankenpflegepersonal.</p>	
Schritt 2: Machen Sie sich bereit	
A	Waschen Sie sich gründlich Ihre Hände. Bereiten Sie Ihre Injektionsstelle vor und reinigen Sie sie.
<p><b>Sie können verwenden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Vorderseite Ihres Oberschenkels.</li> <li>• den Bauch, mit Ausnahme eines Bereiches von 5 cm um Ihren Bauchnabel herum.</li> <li>• die Rückseite des Oberarms (nur wenn eine andere Person Ihnen die Injektion gibt).</li> </ul> <p>Reinigen Sie die Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer. Lassen Sie Ihre Haut trocknen.</p> <p><b>X</b> Berühren Sie die Injektionsstelle <b>nicht</b> mehr vor der Injektion.</p> <p><b>!</b> Injizieren Sie <b>nicht</b> in Bereiche, in denen die Haut empfindlich, verletzt, gerötet oder verhärtet ist. Vermeiden Sie, in Bereiche mit Narben oder Dehnungsstreifen zu injizieren.</p>	
B	Ziehen Sie vorsichtig die graue Nadelschutzkappe gerade heraus, weg von Ihrem Körper.
C	Drücken Sie Ihre Injektionsstelle zusammen, um eine feste Oberfläche zu erzeugen.
<p><b>!</b> Es ist wichtig, die Haut während der Injektion zusammengedrückt zu halten.</p>	
Schritt 3: Injektion	
A	Halten Sie die Haut zusammengedrückt. STECHEN Sie die Nadel in die Haut.
<p><b>X</b> Berühren Sie <b>nicht</b> den gereinigten Bereich der Haut.</p>	
B	DRÜCKEN Sie den Kolben langsam und mit gleichmäßigem Druck herunter, bis Sie ein „Klick“ spüren oder hören. Drücken Sie nach dem Klick vollständig durch.
<p><b>!</b> Es ist wichtig, nach dem „Klick“ vollständig durchzudrücken, um Ihre gesamte Dosis abzugeben.</p>	
C	LASSEN Sie Ihren Daumen los. Anschließend HEBEN Sie die Spritze von der Haut ab.
<p>Nach dem Loslassen des Kolbens wird der Nadelschutz der Fertigspritze die Injektionsnadel sicher umschließen.</p> <p><b>X</b> Setzen Sie die graue Nadelschutzkappe <b>nicht</b> mehr auf gebrauchte Fertigspritzen auf.</p>	
Nur für medizinisches Fachpersonal	
<p>Der Handelsname des angewendeten Arzneimittels soll eindeutig in der Patientenakte dokumentiert werden.</p> <p>Entfernen Sie das Etikett der Fertigspritze und heben Sie es auf.</p>	
<p>Drehen Sie den Kolben, um das Etikett in eine Position zu bringen, in der Sie das Etikett der Spritze entfernen können.</p>	
Schritt 4: Abschluss	
A	Entsorgen Sie die gebrauchte Fertigspritze und andere Materialien in einem durchstichsicheren Behälter.
<p>Arzneimittel sind entsprechend den nationalen Anforderungen zu beseitigen. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Arzneimittel zu entsorgen sind, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.</p> <p>Bewahren Sie die Spritze und den durchstichsicheren Behälter für Kinder unzugänglich auf.</p> <p><b>X</b> Benutzen Sie die Fertigspritze <b>nicht</b> erneut.</p> <p><b>X</b> Führen Sie Fertigspritzen <b>nicht</b> der Wiederverwendung zu oder werfen Sie sie <b>nicht</b> in den Haushaltsabfall.</p>	
B	Kontrollieren Sie die Injektionsstelle.
<p>Falls Sie Blut bemerken, drücken Sie einen Wattebausch oder Verbandmull auf Ihre Injektionsstelle. Reiben Sie <b>nicht</b> an der Injektionsstelle. Falls erforderlich, verwenden Sie ein Pflaster.</p>	