



**Gebrauchsinformation:** Information für den Anwender

# Nux vomica Pentarkan®

Tabletten



**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach Anwendung dieses Arzneimittels nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Nux vomica Pentarkan® und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Nux vomica Pentarkan® beachten?
3. Wie ist Nux vomica Pentarkan® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Nux vomica Pentarkan® aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

## **1. Was ist Nux vomica Pentarkan® und wofür wird es angewendet?**

Nux vomica Pentarkan® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Magenbeschwerden.

## **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Nux vomica Pentarkan® beachten?**

**Nux vomica Pentarkan® darf nicht angewendet werden:**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe, Weizenstärke oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von Nux vomica Pentarkan® sind,
- bei Kindern unter 12 Jahren,
- in der Schwangerschaft und Stillzeit.

## **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Nux vomica Pentarkan® ist erforderlich:**

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

## **Bei Anwendung von Nux vomica Pentarkan® mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Eine Beeinflussung der Wirkung von Nux vomica Pentarkan® durch andere Arzneimittel ist bisher nicht bekannt.

## **Bei Anwendung von Nux vomica Pentarkan® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

## **Schwangerschaft und Stillzeit**

Das Präparat darf aufgrund der Bestandteile Nux vomica und Arsenicum album in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

## **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

## **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Nux vomica Pentarkan®**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose (Milchzucker). Bitte nehmen Sie es daher erst nach Rücksprache mit dem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Weizenstärke kann geringe Mengen Gluten enthalten, die aber auch für Patienten, die an Zöliakie leiden, als verträglich gelten.

## **3. Wie ist Nux vomica Pentarkan® anzuwenden?**

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Beschwerden sollten Erwachsene halbstündlich bis stündlich je 1 Tablette (höchstens 6-mal täglich) einnehmen. Jugendliche von 12–18 Jahren erhalten eine maximale Dosis von 4 Tabletten täglich. Eine über eine Woche hinausgehende häufige Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. In chronischen Fällen sollten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Sie sollten die Tablette eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen einnehmen und sie vorzugsweise langsam im Mund zergehen lassen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

## **Wenn Sie eine größere Menge Nux vomica Pentarkan® angewendet haben, als Sie sollten**

Es sind bisher keine schädlichen Wirkungen von Überdosierungen bekannt. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt halten.

## **Wenn Sie die Anwendung von Nux vomica Pentarkan® vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

## **Wenn Sie die Anwendung von Nux vomica Pentarkan® abbrechen**

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Anwendung von Nux vomica Pentarkan® abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Nux vomica Pentarkan® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Aufgrund des Bestandteils Anacardium können in sehr seltenen Fällen, auch einige Tage nach der Einnahme von Nux vomica Pentarkan®, Magen-Darm-Beschwerden oder Hautreaktionen auftreten. Auch die enthaltene Weizenstärke kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen.

*Hinweis:* Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist Nux vomica Pentarkan® aufzubewahren?**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

#### **Was Nux vomica Pentarkan® enthält**

*Die Wirkstoffe:* Nux vomica Trit. D3 25 mg, Centaurium erythraea e planta tota recente Trit. D1 (HAB, Vorschrift 3a) 25 mg, Anacardium Trit. D4 25 mg, Arsenicum album Trit. D5 25 mg, Leonurus cardiaca Trit. D1 25 mg sind in 1 Tablette verarbeitet.

*Die sonstigen Bestandteile sind:* Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Weizenstärke.

#### **Wie Nux vomica Pentarkan® aussieht und Inhalt der Packung**

Nux vomica Pentarkan® ist eine weißliche Tablette zum Einnehmen.

Packung mit 200 Tabletten

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe  
[info@dhu.de](mailto:info@dhu.de)

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6568456.00.00

### **Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2015.**

---

Nux vomica Pentarkan® enthält fünf Einzelbestandteile, die sich bei der Behandlung von Magenbeschwerden ergänzen. Die Kombination der Bestandteile Nux vomica, Leonurus cardiaca, Centaurium, Anacardium und Arsenicum album beeinflusst den empfindlichen, verdorbenen, sowie den durch Stress, Ärger oder zuviel Kaffee- oder Alkoholgenuss gereizten Magen. Die dadurch auftretenden Magenbeschwerden, wie Magenschmerzen, Übelkeit, Brechreiz, Völlegefühl, Aufstoßen oder Sodbrennen gehören zum Anwendungsbereich von Nux vomica Pentarkan®.