



Ch.-B.:
Verwendbar bis:



Zusammensetzung:

100 g Zinköl enthalten:
Wirkstoff: 50 g Zinkoxid
Sonstige Bestandteile: 50 g Olivenöl
Arzneimittel unzugänglich für Kinder
aufbewahren!
Nach Ablauf des Verfalldatums
nicht mehr anwenden.

Vor Gebrauch schütteln.

PZN 09234521

Art.-Nr. 7891

Zul.-Nr. 7599.99.99

Caesar & Loretz GmbH
Herderstraße 31, D-40721 Hilden
www.caelo.de



Suspension zum
Auftragen auf die Haut

Apothekenpflichtig

● ● ● 120 g N2

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Wundbehandlungsmittel

Anwendungsgebiete:

Zur Abdeckung der Haut von Wundrändern (Ulcera, Erosionen).
Bei Reizungen und Rötungen der Haut im intertrigenösen Bereich
(Hautfalten), im Windelbereich und am Übergangsbereich
Haut/Schleimhaut (Mund, After, Genitalien). Bei Fissuren und
Rhagaden.

Nebenwirkungen:

Nach Auftragen von Zinköl auf stark entzündliche Hautpartien
kann ein leichtes Brennen auftreten. Verschlechterung der
Heilung durch Sekret- und Wärmestau. Hinweis: Wenn Sie
Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt
oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht auf

dieser Packung angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen
auch direkt am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3,
D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie
Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr
Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Ver-
fügung gestellt werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Vor der Anwendung anderer Externa ist Zinköl vollständig
zu entfernen (eingeschränkte Wirkung weiterer Externa).

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, wird Zinköl ein- bis mehrmals
täglich auf die betroffenen Hautflächen aufgetragen.

Stand der Information: September 2020

V7891ET 0521

