



14

Silicea

Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Tabletten zum Einnehmen

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Silicea Trit. D3, Calcium fluoratum Trit. D8, Barium carbonicum Trit. D4 je 45 mg. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke. Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 2513012.00.00 Inhalt: 120 Tabletten

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

14 Silicea Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Tabletten, Originalpackung mit 120 Tabletten

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und

Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen sollte 14 Silicea Komplex

in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?
Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern

unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 1-3mal täglich je 1 Tablette vor bzw. zwischen den Mahlzeiten einnehmen.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Hinweise für den Fall der Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn 14 Silicea Komplex in zu großen Mengen eingenommen wurde?

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite.

Das Arzneimittel ist nach Anbruch des Behältnisses 6 Monate haltbar.

Stand der Information: Juli 2016