



44

Spiraea Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung: 10 g (= 10,98 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Spiraea ulmaria D3 Dil., Strontium chloratum D4 Dil. (HAB, Vorschr. 5a), Apocynum D4 Dil., Convallaria majalis D3 Dil., Kalium carbonicum D3 Dil., Calamus aromaticus D3 Dil., Lobelia inflata D4 Dil., Lycopodium D4 Dil., Sambucus nigra D3 Dil., Valeriana D3 Dil., Veratrum viride (HAB 1934) D4 Dil. [HAB, Vorschr. 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)] je 0,9091 g. Dieses Präparat enthält 60,0 Vol.-% Alkohol. Packungsbeilage beachten!
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
 Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren.
 Req.-Nr.: 2513027.00.00 Inhalt: 50 ml
Ch.-B.: 0000 Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation
44 Spiraea Komplex
 Homöopathisches Arzneimittel
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
 1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
 Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
 Wann dürfen Sie 44 Spiraea Komplex nicht einnehmen?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 44 Spiraea Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 44 Spiraea Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 44 Spiraea Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
 Dieses Arzneimittel enthält 60,0 Vol.-% Alkohol. Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,36 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken

oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
 Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
 Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
 Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
 Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
 Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
 Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen.
 Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen:
 Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
 siehe Rückseite
Stand der Information: November 2017